

抗生素类抗感染药：头孢菌素类-氟氧头孢钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_183256.htm 【摘要】氟氧头孢钠属于头孢菌素类抗生素栏目，主要讲述了 药物名称 氟氧头孢钠 药物别名 英文名称 Flomoxef Sodium 说明 注射用氟氧头孢钠：每瓶0.5g、1g或2g，历时1小时，最高血药浓度分别为 $20\mu\text{g/ml}$ 、 $45\mu\text{g/ml}$ 和 $90\mu\text{g/ml}$ ， $t_{1/2}(\beta)$ 分别为73.4、49.2和40分钟。如以上量点滴2小时，则最高血药浓度分别为 $10\mu\text{g/ml}$ 、 $24\mu\text{g/ml}$ 和 $48\mu\text{g/ml}$ ， $t_{1/2}(\beta)$ 分别为46.2分钟、57分钟和69分钟。体内分布较广泛，可进入胆汁、痰液、腹水、骨盆死腔渗出液以及子宫及附属器官、中耳粘膜和肺组织中。体内少部分代谢，大部分（85%）以原形经肾排泄。肾功能减退者排出减少。应用于上述敏感菌所致的咽炎、扁桃体炎、支气管炎、肺炎、肾盂肾炎、膀胱炎、

前列腺炎、胆道感染、腹膜炎、盆腔炎、子宫及附属组织炎症、中耳炎、创口感染、心内膜炎及败血症等。用法用量 轻症：成人1日量1~2g，分成2次静注；儿童1日60~80mg/kg，分2次静注或静滴。重症：成人1日4g，分2~4次用；儿童1日150mg/kg，分3~4次用。注意事项（1）对青霉素类过敏及过敏体质者慎用。严重肾功能障碍者、依靠静脉营养者、高龄者及全身状态恶化者均应慎用。（2）不良反应有肾功能减退（BUN上升），造血系统变化（红细胞减少、粒细胞减少、血红蛋白降低、嗜酸细胞增多、血细胞比容下降、血小板减少或增多，并罕见溶血性贫血），肝酶单项或多项上升，恶心、呕吐、腹泻、软便、伪膜性肠炎（罕见），皮疹及瘙痒，过敏性休克，药物热，咳嗽、呼吸困难及肺X光影象改变症状，口腔炎，头晕、倦怠、血或尿淀粉酶升高以及注射局部静脉炎等。（3）对孕妇及新生儿的用药安全性尚未确定，一般不宜应用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com