

抗生素类抗感染药：头孢菌素类-头孢米诺钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_183258.htm 【摘要】头孢米诺钠属于头孢菌素类抗生素栏目，主要讲述了 药物名称 头孢米诺钠 药物别名 英文名称 Cefminox Sodi 说明 注射用头孢米诺钠：每瓶0.5g。 功用作用 对链球菌（肠球菌除外）、大肠杆菌、克雷白杆菌、变形杆菌、流感嗜血杆菌、拟杆菌等有抗菌作用。本品尚对细菌细胞壁中肽聚糖生成脂蛋白起妨碍作用。脂蛋白结构为革兰阴性菌所特有，因...。本文重点关注头孢米诺钠 药物作用 等内容，您可以在本页对头孢米诺钠进行讨论【关键字】头孢菌素类抗生素.头孢米诺钠.药物.作用.头孢米诺钠【全文】药物名称 头孢米诺钠 药物别名 英文名称

Cefminox Sodi说明 注射用头孢米诺钠：每瓶0.5g；1g（效价）。 功用作用 对链球菌（肠球菌除外）、大肠杆菌、克雷白杆菌、变形杆菌、流感嗜血杆菌、拟杆菌等有抗菌作用。头霉素类有较强的抗 β -内酰胺酶性能。本品尚对细菌细胞壁中肽聚糖生成脂蛋白起妨碍作用。脂蛋白结构为革兰阴性菌所特有，因此，本品对革兰阴性菌的作用较其他同类药物为强。 静脉注射0.5g或1g，注毕时血药浓度分别为 $50\mu\text{g/ml}$ 和 $100\mu\text{g/ml}$ 。体内分布以腹水、子宫内膜、胆汁中浓度较高，痰液中浓度低。由肾脏排泄，在尿液中有甚高浓度，肾功能障碍者本品的排泄受阻， $t_{1/2}$ 约2.5小时。 临床应用 于上述敏感菌所致的扁桃体、呼吸道、泌尿道、胆道、腹腔、子宫等部位感染，也可用于败血症。 用法用量 静注或静滴，成人每次1g，1日2次；儿童1次 20mg/kg ，1日3~4次。败血症时，

成人1日可用到6g，分3～4次给予。本品静注，每1g药物用20ml注射用水、5%～10%葡萄糖液或0.9%氯化钠液溶解。滴注时，每1g药物溶于输液100～200ml中，滴注1～2小时。

注意事项（1）偶可致过敏，有皮疹、发热等，也可致休克，对青霉素、其他头孢菌素过敏者应慎用。（2）可致肾损害，如血肌酐值上升，BUN上升、少尿、蛋白尿等。（3）血液系统毒性，可致血液有形成分的减少。（4）肝酶升高，血胆红素升高及黄疸等也可发生。（5）消化道症状有食欲不振、恶心、呕吐、腹泻等，菌群失常而致维生素缺乏和二重感染等也可发生。（6）其他参见头孢美唑。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com