

抗生素类抗感染药：头孢菌素类-拉氧头孢钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_183259.htm 【摘要】拉氧头孢钠属于头孢菌素类抗生素栏目，主要讲述了 药物名称 拉氧头孢钠 药物别名 羧羧氧酰胺菌素，拉他头孢moxalactam

，shiomarin 英文名称 latamoxef sodium 说明 注射用拉氧头孢钠：每瓶0.259；0.5g；功用作用 抗菌谱与头孢噻肟近似，对多种革兰阴性菌有良好的抗菌作用。大肠杆菌、流感杆菌、克雷白杆菌、各型变型杆菌、肠杆菌属、枸橼酸杆菌、...。本文重点关注头孢 ml 杆菌 小时 等内容，您可以在本页对拉氧头孢钠进行讨论【关键字】头孢菌素类抗生素.头孢.ml.杆菌.小时.拉氧头孢钠【全文】药物名称 拉氧头孢钠药物别名 羧羧氧酰胺菌素，拉他头孢 moxalactam，shiomarin英文名称 latamoxef sodium说明 注射用拉氧头孢钠：每瓶0.259；0.5g；功用作用 抗菌谱与头孢噻肟近似，对多种革兰阴性菌有良好的抗菌作用。大肠杆菌、流感杆菌、克雷白杆菌、各型变型杆菌、肠杆菌属、枸橼酸杆菌、沙雷杆菌等常对本品高度敏感。对厌氧菌（如拟杆菌），有良好的抗菌作用。此外，由于本品的耐 β -内酰胺酶的性能强，微生物对本品很少发生耐药性。肌注1g，经1小时，血药浓度达峰值，为 $49\mu\text{g}/\text{ml}$ ，到第8小时仍可保持 $4.5\mu\text{g}/\text{ml}$ 。静注1g，即时的血浓度为 $170\mu\text{g}/\text{ml}$ ，到第2小时为 $29\mu\text{g}/\text{ml}$ ，到第6小时约为 $6\mu\text{g}/\text{ml}$ 。本品在体内分布广，可进入痰液、腹水、羊水、脑脊液中。通过肾脏和肝脏排出，在尿液和胆汁中浓度高。本品的 $t_{1/2}$ 为1.8~2小时。临床上用于上述敏感菌所致肺炎、气管炎、胸膜炎、腹

膜炎，以及皮肤和软组织、骨和关节、五官、创面等部位的感染，还可用于败血症和脑膜炎。用法用量（1）肌注：1次0.5～1g，每日2次，用0.5%利多卡因注射液溶解，深部肌注。（2）静注：1次1g，每日2次，溶解于10～20ml液体中，缓缓注入。（3）静滴：1次1g，每日2次，溶于液体100ml中滴入，重症可加倍量给予。（4）儿童用量：1日40～80mg/kg，分2～4次。静注和静滴可用等渗氯化钠溶液、5%～10%葡萄糖注射液、灭菌注射用水、低分子右旋糖酐注射液等作溶剂，但不得与甘露醇注射液相配伍。注意事项（1）偶可致过敏性休克或其他过敏症状。（2）其他不良反应有肾脏损害、血象改变、肝功能受损、胃肠道反应、菌群失调等。（3）本品还可致出血倾向，剂量增大时尤甚。（4）溶解后应立即使用，未用完的药液必须在冰箱中保存，在24小时内用完。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com