

抗生素类抗感染药：头孢菌素类-头孢西丁钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_183260.htm 【摘要】头孢西丁钠属于头孢菌素类抗生素栏目，主要讲述了 药物名称 头孢西丁钠 药物别名 噻吩甲氧头孢菌素，甲氧头霉噻吩 英文名称 Cefoxitin Sodium 说明 注射用头孢西丁钠：每瓶1g。 功用作用 作用与第二代头孢菌素相似。对革兰阴性菌作用强。对大肠杆菌、克雷白杆菌、流感嗜血杆菌、淋球菌、奇异变形杆菌、吲哚阳性变形杆菌等有抗菌作用。。 本文重点关注头孢西丁 ml 作用 杆菌 等内容，您可以在本页对头孢西丁钠进行讨论【关键字】头孢菌素类抗生素.头孢西丁.ml.作用.杆菌.头孢西丁钠【全文】药物名称 头孢西丁钠药物别名 噻吩甲氧头孢菌素，甲氧头霉噻吩英文名称 Cefoxitin Sodium说明 注射用头孢西丁钠：每瓶1g。 功用作用 作用与第二代头孢菌素相似。对革兰阳性菌的抗菌性能弱。对革兰阴性菌作用强。对大肠杆菌、克雷白杆菌、流感嗜血杆菌、淋球菌、奇异变形杆菌、吲哚阳性变形杆菌等有抗菌作用。 本品还对一些厌氧菌有良好的作用，如消化球菌、消化链球菌、梭状芽胞杆菌、拟杆菌（包括脆弱拟杆菌）对本品敏感。绿脓杆菌、肠球菌和阴沟杆菌的多数菌株对本品不敏感。 肌注1g，血药浓度于20～30分钟达峰值，约为24 μg / ml；静注1g，5分钟血药浓度为110 μg / ml，4小时降为1 μg / ml。t_{1/2}～1小时。约85%药物以原形于6小时内由尿排泄。肌注1g，尿药峰浓度可达3000 μg / ml。 临床应用于敏感的革兰阴性菌或厌氧菌所致的下呼吸道、泌尿生殖系、腹腔、骨和关节、皮肤和软组织

等部位感染，也可用于败血症。用法用量 成人：1次1~2g，1日3~4次。肾功能不全者按其肌酐清除率制订给药方案：肌酐清除率为30~50ml / 分者每8~12小时用1~2g；10~29ml / 分者每12~24小时用1~2g；5~9ml / 分者每12~24小时用0.5~1g；<5ml / 分者每24~48小时用0.5~1g。注意事项 妊娠B类。对青霉素过敏者、妊娠及哺乳妇女慎用。（1）妊娠早期及哺乳期妇女慎用；（2）对青霉素过敏者慎用；（3）同时接受强利尿剂（如速尿）者，可使肾功能损害；（4）不可与氨基糖甙类抗生素置于同一容器中注射；（5）片剂不可压碎后服用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com