

抗生素类抗感染药：头孢菌素类-头孢克肟 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_183262.htm 【摘要】头孢克肟属于头孢菌素类抗生素栏目，主要讲述了 药物名称 头孢克肟 药物别名 世伏素，FK027，CEFSPAN 英文名称 Cefixime 说明 胶囊剂：胶囊50mg或100mg。 功用作用 本品具第三代头孢菌素的抗菌特性，其抗菌谱包括链球菌、肺炎链球菌、淋球菌、大肠杆菌、克雷白杆菌、卡他布拉汉菌、沙雷杆菌、枸橼酸杆菌、阴沟肠杆菌、产气肠杆菌、流感...。本文重点关注 头孢 ml 药物 杆菌 等内容，您可以在本页对头孢克肟进行讨论【关键字】头孢菌素类抗生素.头孢.ml.药物.杆菌.头孢克肟

【全文】药物名称 头孢克肟 药物别名 世伏素，FK027，CEFSPAN 英文名称 Cefixime 说明 胶囊剂：胶囊50mg或100mg；颗粒：每g中含本品50mg（效价）。功用作用 本品具第三代头孢菌素的抗菌特性，其抗菌谱包括链球菌、肺炎链球菌、淋球菌、大肠杆菌、克雷白杆菌、卡他布拉汉菌、沙雷杆菌、枸橼酸杆菌、阴沟肠杆菌、产气肠杆菌、流感嗜血杆菌等。对细菌的 β -内酰胺酶甚稳定。正常人1次空腹口服50mg、100mg、200mg，4小时血中药物水平达峰，分别为 $0.69\mu\text{g/ml}$ 、 $1.18\mu\text{g/ml}$ 、 $1.95\mu\text{g/ml}$ ， $t_{1/2}$ 为2.3~2.5小时。儿童1次按 1.5mg/kg 、 3.0mg/kg 、 6.0mg/kg 空腹服用，3~4小时血药水平达峰，分别为 $1.14\mu\text{g/ml}$ 、 $2.01\mu\text{g/ml}$ 、 $3.97\mu\text{g/ml}$ ， $t_{1/2}$ 为3.2~3.7小时。体内分布，以痰、扁桃体、颌窦、中耳分泌物及胆汁中浓度较高。0~12小时的尿排泄率为20%~25%，口服50mg，4~6小时尿液药物峰浓度

为42.9%。临床上应用于上述敏感菌所引起的肺炎、支气管炎、泌尿道炎、淋病、胆囊炎、胆管炎、猩红热、中耳炎、副鼻窦炎等。用法用量 成人及体重30kg以上的儿童：1次50～100mg，1日2次；重症1次口服量可增至200mg。儿童：1次1.5～3mg/kg，1日2次，重症1次量可增至6mg/kg。注意事项（1）本品偶引起过敏性反应，如皮疹、瘙痒、发热、颗粒性白细胞减少、嗜酸细胞增多、血小板减少；可致肝氨基转移酶及碱性磷酸酶升高；可致菌群失常、并引起维生素缺乏或二重感染，也可致过敏性休克。（2）本品可干扰尿糖反应，使Benedict、Fehling及Clintest试验出现假阳性反应。并可使直接血清抗球蛋白试验（Coombs test）出现阳性反应。（3）肾功能不足者应减量使用。（4）孕妇、新生儿、早产儿均宜慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com