

执业药师《中药学综合知识与技能》辅导：中成药的贮存和养护 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/19/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_19075.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/19/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_19075.htm)

1.丸剂 丸剂可分为蜜丸、水丸、糊丸、浓缩丸、微丸等。（1）蜜丸：蜜丸是最不易保存的一种剂型。应防潮、防霉变、虫蛀，密闭，注意包装完好。（2）水丸：因颗粒比较疏松，与空气接触面积较大，易吸收空气中的水分，造成霉变、虫蛀、松碎等。宜置于干燥密封处。（3）糊丸：因赋形剂是米糊或面糊医学教育网原创，所以此类药亦不易保存。

2.散剂 散剂的吸湿性与风化性较显著，故须充分干燥，包装防潮性能要好。散剂一般应密闭贮存。3.片剂 片剂因含药材粉末或浸膏量较多，因此极易吸潮、松片、裂片以致粘结、霉变等。片剂应密封贮藏，宜置于室内凉爽、通风、干燥、避光处保存。4.膏剂

（1）煎膏剂（膏滋）：煎膏剂如枇杷膏、益母草膏等若保管不当，可出现结皮、霉变、发酵、变酸、糖晶析出等现象，而不宜药用。煎膏剂应密封，置于室内阴凉干燥处保存。

（2）膏药：贮于密闭容器内，置于阴凉处贮存。（3）软膏（油膏）：应在遮光容器中密闭贮存，置于阴凉、干燥处。

5.合剂 置于阴凉处保存。在贮存期间允许有少量轻摇易散的沉淀。6.颗粒剂 应密封贮存于室内阴凉、干燥处。7.胶囊剂 胶囊容易吸收水分，轻者可膨胀，胶囊表面浑浊，严重时会长霉、粘连，甚至软化、破裂。胶囊遇热易软化、粘连，故贮存温度不宜超过30℃；过于干燥又易脆裂。故应密封贮存于室内阴凉干燥处。8.糖浆剂 由于糖浆剂中含有蔗糖，其水溶液易被霉菌、酵母菌等所污染，使糖浆被分解而酸败、混

浊。除另有规定外，糖浆剂含蔗糖量最好为60%（g/l），近于饱和溶液。盛装容器为棕色瓶，灌装后密封。贮于室内阴凉处。

9.注射剂（针剂）注射剂易受到光、热影响，因此应密封于中性硬质玻璃安瓿中，遮光，防冻结，防高热等。注射剂除应遮光贮藏外，并应按规定的条件贮藏。

10.胶剂 胶剂宜密闭贮藏，置于室内阴凉干燥处防止受潮。

11.酒剂 酒剂应密封，置阴凉处贮存医学教，育网原创。在贮藏期间允许有少量轻摇易散的沉淀。

12.露剂 因此露剂应密封，置阴凉处保存。

13.栓剂 应在30℃以下密闭保存，防止因受热、受潮而变形、发霉、变质

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)