

药学综合技能(五) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/19/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_AD\\_A6\\_E7\\_BB\\_BC\\_E5\\_c23\\_19086.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/19/2021_2022__E8_8D_AF_E5_AD_A6_E7_BB_BC_E5_c23_19086.htm) [A型题] 1.对晚期癌症患者为止痛使用的麻醉药品应 A 放开作用 B 严格控制使用，避免成瘾 C 口服用药放开，注射用药严控 D 凭麻醉专用卡,到指定医院按规定开具处方 E 凭麻醉专用卡,到任何医院按规定开具处方 2.发药是处方调配工作中 A 病人与药师接触的第一窗口 B 重要一环 C 与划价同步进行 D 检查处方书写正确与否的一环 E 最后环节 3.发药时，药师必须向患者详细交待用法，用量及用药的注意事项，这是因为 A防止患者服错药 B 增加患者用药的水平 C 增加患者用药的依从性 D 增强为患者服务的意识 E 避免重复开药 4.在整个发药过程中，检查、核对是保证 A 发药数量的关键 B 发药质量的关键 C 治疗水平的关键 D 药品质量的关键 E 药品效价的关键 5.化学成分相同而商品名不同的药物应属 A 同类药品 B 相似药品 C 不同类药品 D 手征性药品 E 同一药品 6.评定患者是否具有依从性的条件是 A 能否听从医师的劝告 B 能否接受医师的治疗 C 能否服从药师的指导 D 能否遵守医师的治疗方案并服从对健康方面的指导 E 能否遵守医院的规定 7.不依从性的大小与什么有关 A 用药方案的指导性 B 用药方案的选择性 C 用药方案的时间性 D 用药方案的复杂性 E 用药方案的有效性 8.在治疗中因患者自感病情好转止服药应属 A 治疗失败 B 无意的违背医嘱 C 缺乏用药指导 D 老年性健忘 E 对药物疗效期望过高 9.产生不依从性的首要原因是 A 老年性健忘 B 药物不良反应 C 药物的剂型和规格 D 自行调整剂量 E 缺乏用药指导 10.皮下注射适用于 A 心

内注射 B 快速吸收 C 少量药液 (小于2ml) D 疾病较轻 E 用量较大 (大于10ml) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)