药物分析笔记:药典知识 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/19/2021_2022__E8_8D_AF_E 7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_19093.htm 中国药典:凡例(30条) 、正文、附录和索引。 溶解度:极易溶解:易溶:1---10ml 中溶解 热水: 70----80 溶解: 10 --- 30ml 中溶解 微温或温水 : 40----50 略溶: 30 --- 100ml 中溶解 室温: 10----30 微溶: 100 ---1000ml 中溶解 冷水: 2-----10 极微溶:1000---10000ml 中溶解 冰浴: 0 几乎不溶: 10000ml 中不能完全溶 放冷:放 冷至室温 液体的滴系指在20 C时, 1.0ml水相当于20滴。 粉末 粗细:最粗粉:指能全部通过一号筛,但混有能通过三号筛 不超过20%的粉末。 粗粉: 指能全部通过二号筛, 但混有能 通过四号筛不超过240%的粉末。 中粉: 指能全部通过四号筛 ,但混有能通过五号筛不超过60%的粉末。 细粉: 指能全部 通过五号筛,并含能通过六号筛不少于95%的粉末。 极细粉 :指能全部通过六号筛,并含能通过七号筛不少于95%的粉 末。 最细粉:指能全部通过八号筛,并含能通过九号筛不少 于95%的粉末 阴凉处: 不超过20 C 凉暗处:避光不超过20 C 冷处:2----10 C 称1.0,指0.06---0.14。 称2.0g,指1.5---2.5 g 2.00g 指1.995---2.005g。 精密称定:准确至千分之一。 称定: 准确至百分之一。 取用量为"约": 10% 垣重:连续两次差 异在0.3mg以下,干燥离第一次1小时后,炽灼离第一次30分 后。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请 访问 www.100test.com