

执业药师《药学综合知识与技能》辅导：各类降压药物的选用 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/19/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_19125.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/19/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_19125.htm)

一、各类降压药物的

选用（1）利尿剂 适应症：主要用于一、二级高血压，尤其在老年高血压或并发心力衰竭者；禁用慎用：痛风患者禁用，糖尿病和高脂血症患者慎用。不良反应：低血钾、高血糖、高尿酸、脂质代谢紊乱。用法用量：可选择使用氢氯噻嗪

（Hydrochlorothizide）12.5mg，每日1~2次；吲哒帕胺

（Indapamide）1.25~2.5mg，每日1次。呋塞米（Furosemide

）仅用于并发肾功能衰竭时医。（2）-阻滞剂 适应症：主要用于一、二级高血压，尤其在静息时心率较快（>80次/分）的中青年患者或合并心绞痛时。禁用慎用：心脏传导阻滞、哮喘、慢性阻塞性肺病与周围血管病患者禁用。糖尿病患者慎用。不良反应：支气管痉挛、心功能抑制。用法用量：

可选择使用美托洛尔（Metoprolol）50mg，每日1~2次；阿替洛尔（Atenolol）25mg，每日1~2次；比索洛尔（Bisoprolol

）2.5~5mg，每日1次；倍他洛尔（Betaxolol）5~10mg，每日1次。

-阻滞剂可用于心衰，但用法与降压完全不同，应

加注意。（3）钙拮抗剂 适应症：可用于各种程度的高血压

，尤其在老年高血压或合并稳定型心绞痛时。禁用慎用：心脏传导阻滞和心力衰竭患者禁用非二氢吡啶类钙拮抗剂（地尔硫卓、维拉帕米）。

不稳定性心绞痛和急性心肌梗死时禁用速效二氢吡啶类钙拮抗剂。不良反应：二氢吡啶类为水肿、头痛、潮红；非二氢吡啶类可引起心脏传导阻滞、心功抑制。

用法用量：优先选择使用长效制剂，例如非洛地平

( Felodipine ) 缓释片 5 ~ 10mg , 每日 1 次 ; 硝苯地平  
( Nifedipine ) 控释片 30mg , 每日 1 次 ; 氨氯地平  
( Amlodipine ) 5 ~ 10 mg , 每日 1 次 ; 拉西地平 ( Lacidipine ) 4  
~ 6mg , 每日 1 次 ; 医学教 ; 育网原创维拉帕米 ( Verapamil )  
缓释片 120 ~ 240mg , 每日 1 次。一般情况下也可使用硝苯地平  
或尼群地平普通片 10mg , 每日 2 ~ 3 次。慎用硝苯地平速效胶  
囊。 ( 4 ) 血管紧张素转换酶抑制剂 适应症 : 主要用于高血压  
合并糖尿病 , 或者并发心脏功能不全、肾脏损害有蛋白尿  
的患者。 禁用慎用 : 妊娠和肾动脉狭窄、肾功能衰竭 ( 血肌  
酐 > 265  $\mu$  mol/L 或 3mg/dL ) 患者禁用。 不良反应 : 咳嗽、血  
钾高、血管性水肿。 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直  
接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)