执业药师《药学综合知识与技能》辅导：化学药物之间的相互作用 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/19/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_19136.htm

(1) 氨基苷类抗生素 (阿米卡星、庆大霉素、奈替米星、链霉素、妥布霉素) 髓襻利尿剂 (布美他尼、医学、教育网原创依他尼酸、呋塞米、托拉塞米)，应避免使用。(2) 三环抗抑郁药 (阿米替林、阿莫沙平、氯米帕明、多塞平、氯丙咪嗪、马普替林、去甲替林、普罗替林、曲米帕明) 酶诱导剂 (巴比妥类、卡马西平、利福平)，需增加抗抑郁药的剂量。(3) 三环类抗抑郁药 (阿米替林、阿莫沙平、氯米帕明、多塞平、氯丙咪嗪、马普替林、去甲替林、普罗替林、曲米帕明) 酶抑制剂 (西咪替丁、地尔硫、氟西汀、氟伏沙明、吗氯贝胺、神经松弛药、帕罗西汀、丙氧芬、奎尼丁、维拉帕米)，需减少抗抑郁药的剂量。(4) 抗糖尿病药 (胰岛素、甲磺丁脲、氯磺丙脲等) -肾上腺素受体阻滞剂，可诱导低血糖，并引起心动过速。(5) 西沙比利、H1拮抗剂、阿司咪唑 (息斯敏) 或特非那丁 伊曲康唑或康唑酮，应属禁忌。(6) 可乐定 抗抑郁药 (阿米替林、地昔帕明、丙米嗪)，应尽可能不合用。如果合用，需调整剂量并严密监视。(7) 洋地黄毒苷或地高辛 钙通道阻滞剂 (地尔硫、硝苯地平、维拉帕米) 或胺碘酮、奎尼丁，可导致洋地黄毒苷或地高辛浓度或毒性增加。(8) 戒酒硫 (治疗慢性酒精中毒药) 乙醇，可引起严重的反应，甚至死亡。(9) 红霉素或甲红霉素 阿司咪唑或特非那丁，应属禁忌 (可使阿司咪唑或特非那丁血药浓度增高，常规剂量下发生室性心律失常的危险性增加)。

(10) 保钾利尿药 (阿米洛利、螺内酯、氨苯蝶啶) 血管紧张素转移酶抑制剂 (雷米普利、卡托普利) ，需监测血钾浓度，高血钾引起的心搏停止与此相互作用有关。(11) 喹诺酮类 (环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星) 抗酸药 (口服铁盐、硫糖铝) ，喹诺酮类抗菌疗效降低。(12) 茶碱类 酶诱导剂 (或酶抑制剂) ，需要增加 (或减少) 茶碱用量。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com