

执业药师《药学综合知识与技能》辅导：老年人常用药物的不良反应 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/19/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_19139.htm

1.镇静安眠药，易引起神经系统抑制。 2.解热镇痛药对于发热的老年人，可导致大汗淋漓，长期服用，可导致胃出血。 3.降压药长期应用导致精神忧郁症。 4.抗心绞痛药物可诱发或加重青光眼。 5.抗心律失常药如胺碘酮可出现室性心动过速。美西律可出现眩晕、低血压、手震颤、心动过缓和传导阻滞。 6. β -受体阻滞剂如普萘洛尔可致心动过缓、心脏停搏，还可诱发哮喘，加重心衰。 7.利尿剂可致脱水、低血钾等不良反应。 8.庆大霉素、卡那霉素与利尿剂合用可加重耳毒性反映，可致耳聋，还可使肾脏受损。 9.降糖药，因老年人肝肾功能减退、易发生低血糖反应。 10.洋地黄类药物如地高辛等强心药可引起室性早搏、传导阻滞及低钾血症等洋地黄中毒反应。 11.抗胆碱药物可使老年前列腺增生的病人抑制排尿括约肌而导致尿潴留。 12.抗过敏药物可致思睡、头晕、口干等反应。 13.皮质激素类长期应用可致水肿、高血压、易使感染扩散，可诱发溃疡病出血。 14.维生素及微量元素如维生素A过量可引起中毒，维生素E过量会产生严重副作用，如静脉血栓形成、头痛及腹泻等；微量元素锌补充过量可致高脂血症及贫血；硒补给过多，可致慢性中毒，引起恶心、呕吐、毛发脱落、指甲异常等。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com