

1998年全国执业药师资格考试专业知识（一）试题（70-140）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/19/2021_2022_1998_E5_B9_B4_E5_85_A8_c23_19158.htm 一、A型题（最佳选择题）共20题

，每题1分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。71.凡士林应选用什么方法灭菌 A.湿热灭菌 B.滤过除菌 C.干热空气灭菌 D.紫外线灭菌 E.环氧乙烷灭菌 72.制备防风通圣丸时，用滑石粉的目的为 A.起模 B.盖面 C.包衣 D.加大成型 E.润滑 73.生产某一片重为0.25g的药品50万片，需多少干颗粒 A.200kg B.500kg C.250kg D.125kg E.750kg 74.《中华人民共和国药典》1995年版规定大蜜丸水分限量为 A. 150% B. 16% C. 17% D. 18% E. 19% 75.下列哪种融合物可作为蜜丸润滑剂 A.蜂蜡与芝麻油的融合物 B.软肥皂与甘油的融合物 C.液体石蜡与软肥皂的融合物 D.石蜡与芝麻油的融合物 E.蜂蜡与液体石蜡的融合物 76.以水溶性强的基质制备滴丸时应选用下列哪一种冷却剂 A.水 B.乙醇 C.液体石蜡与乙醇的混合物 D.煤油与乙醇的混合物 E.液体石蜡 77.《中华人民共和国药典》1995年版规定的糖衣片的崩解时限是 A.60分钟 B.45分钟 C.15分钟 D.70分钟 E.30分钟 78.下列有关除去热原方法的错误叙述为 A.普通除菌滤器不能滤除热原 B.0.22 μm微孔滤膜不能除去热原 C.普通灭菌方法不能破坏热原活性 D.121℃ 20分钟，热压灭菌能破坏热原活性 E.干热250℃，30分钟能破坏热原活性 79.将脂溶性药物制成起效迅速的栓剂应选用下列哪种基质 A.可可豆脂 B.氢化油类 C.半合成椰子油脂 D.聚乙二醇 E.半合成棕榈油脂 80.有关药物化学反应半衰期的正确叙述为 A.药物在特定温度下效价下降一半所需要的时间 B.药物溶解一半所需要的时间

间 C.药物分解10%所需要的时间 D.药物在体内消耗一半所需要的时间 E.药物溶解10%所需要的时间 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com