

2011年初级护师辅导：透析性低血压的症状_护士资格考试_
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_88_9D_c21_2180.htm)

[_E5_88_9D_c21_2180.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_88_9D_c21_2180.htm) 低血压早期症状多较轻微，当出现面色苍白、乏力、出汗、脉细速等明显症状时，收缩压常已降到70mmHg以下。故作为血透室护士必须具有高度责任心

，灵敏的观察力，从细微之处观察患者的反应。如：患者性格比较外向，在透析前和透析中言语较多，但在透析一段时间后，患者懒于言语，对周围环境反应淡漠，护士应及时询问患者有无不适感并测量血压、脉搏，警惕低血压的发生。

更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库
护理学专业（护士）《相关专业知识》全真模拟试汇总
护理学专业（护士）《基础知识》全真模拟试题 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com