

2011年内科护理：蛛网膜下腔出血患者并发症的观察和护理 _
护士资格考试 _PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_2362.htm 蛛网膜下腔出血患者并发症的观察和护理：严密观察病情变化是最重要的。动脉瘤再出血及脑血管痉挛是蛛网膜下腔出血最常见最严重的并发症，致残致死率高。SAH后一个月内再出血危险性最大，2周内发生率54%~80%，近期再生病的死亡率41%~46%.明显高于SAH的病死率25%.迟发性脑血管痉挛多发生在病后10~14天，7~10天是高峰期，是死亡和伤残的重要原因。严密观察病情变化。有报道SAH患者心电图异常随着病情而变化，病情恶化者心电图异常明显加重，发生再出血和脑血管痉挛者，心电图异常严重。警惕心肌缺血和心律失常发生。更多信息请访问：护士课程免费试听 护士互动交流 护士模拟试题在线测试 护理学专业（护士）《相关专业知识》全真模拟试汇总 护理学专业（护士）《基础知识》全真模拟试题 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com