

2010年护士社区护理：口服抗过敏药的注意事项_护士资格考试_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_8A_A4_c21_2544.htm

口服抗过敏药的注意事项：因为某些抗过敏药可能会导致严重不良后果。所以，在使用抗过敏药物前，一定要慎重。有些人只要身上痒，就马上服用抗过敏药，其实这种做法很危险。因为某些抗过敏药可能会导致严重不良后果，如引起室性心律不齐、心脏骤停等。所以，在使用抗过敏药物前，一定要慎重。来源：www.examda.com

据了解，有些抗过敏药物在有效对抗过敏的同时，容易产生困倦、思睡的副作用；有的药物还会使服用者头晕、乏力、视力模糊。因此，高空作业，驾驶员、机械操作者，在工作前不可服用有中枢抑制作用的抗组胺药物。如果在工作中需要服药，那么可以使用第二代抗过敏药苯茛胺，这种药不仅对各种常见过敏性疾病有，而且作用缓和，特别是没有嗜睡的副作用，因此使用这种药后不影响服用者的工作。此外，急性哮喘、尿梗阻、青光眼、高血压或胃溃疡等患者，应在医师指导下用药，否则不得使用；由哮喘、吸烟引起的持续性或慢性咳嗽，由肺气肿引起的咳嗽多痰者，应在医师指导下用药，否则不得使用。服药时不得同时饮酒，或服用镇静药及抗抑郁药，否则会抑制中枢神经系统，出现嗜睡，昏迷，甚至脑缺氧症状。需要指出的是，孕妇、哺乳期妇女、婴幼儿及老年人应慎用。更多信息请访问：百考试题护士网校100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com