

2011年手术室护理：手术中蛛网膜下腔阻滞的常见并发症及处理要点_护士资格考试_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E6_89_8B_c21_2575.htm 手术中蛛网膜下腔阻滞的常见并发症及处理要点：

血压下降，呼吸抑制，恶心、呕吐。手术中蛛网膜下腔阻滞的常见并发症及处理要点：来源：考试大

（1）血压下降、心动过缓：麻醉平面越高，发生率越高，程度也越严重。血压下降，应先加快输液速度，如无效，遵医嘱注射麻黄碱；心动过缓，可静脉注射阿托品。（2）呼吸抑制：见于高平面麻醉时，平面越高，程度越严重。其症状为胸闷气短、咳嗽无力、说话费力。应安慰病人，给氧或面罩下给氧辅助呼吸，一旦呼吸停止，立即气管内插管和人工呼吸。（3）恶心、呕吐：常见原因有：麻醉平面过高，发生低血压和呼吸抑制，导致脑缺氧而兴奋呕吐中枢。迷走神经亢进，胃肠蠕动增强。腹腔内脏受到牵拉。病人对辅用的哌替啶较敏感，应针对原因采取防治措施，如提升血压、给氧、麻醉前给予阿托品、减少或停止对腹腔内脏牵拉等；必要时，给氟哌利多。护理重点是及时清理呕吐物，保持枕褥清洁，遵医嘱给药。更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 护理学专业（护士）《相关专业知识》全真模拟试汇总 护理学专业（护士）《基础知识》全真模拟试题 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com