

2011年基础护理：静脉化疗时如何保护血管_护士资格考试_
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_9F_BA_c21_2624.htm)

[_E5_9F_BA_c21_2624.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_9F_BA_c21_2624.htm) 静脉化疗时保护血管的时期：静脉注射化疗药物前，静脉注射化疗药物的过程中，化疗药物注射完后，注射完毕。临床经常可以看到，长期行静脉化疗的病人，有些静脉血管会出现变黑或明显的色素沉着。这是因为化疗药物刺激血管所致。那么住静脉化疗的过程中，如何保护好静脉血管呢？

- 一、静脉注射化疗药物前，应先注射0.9%氯化钠50~100ml，确保穿刺成功后，再使用化疗药物。来源：百考试题网
- 二、静脉注射化疗药物的过程中，护士应多巡视病房，随时观察点滴情况，药物有无外渗，并嘱患者也要谨慎，发现异常及时通知护士。
- 三、化疗药物注射完后，应继用0.9%氯化钠100~250ml，以冲洗停留在静脉血管壁上的药物，从而达到防止静脉血管变黑的目的。
- 四、注射完毕，拔针时应在针眼处多加压片刻，并嘱患者抬高被注射的肢体，有利于化疗药物随静脉回流。
- 五、若不慎将化疗药物漏到血管外，可应用硫酸镁冷湿敷。
- 六、静脉注射时，要交叉使用静脉，勿在一条静脉上长期注射。

更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com