

2011年中医护理：小儿顿咳的一般护理\_护士资格考试\_PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/2/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c21\\_2636.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c21_2636.htm) 小儿顿咳的一般护理：从发病开始隔离6周，饮食宜富有营养而易于消化等。从发病开始隔离6周，或从痉咳开始计算隔离4周。饮食宜富有营养而易于消化，忌食辛辣、油腻、发物，少量多餐，缓慢进食，以免诱发痉咳。痉咳时应停止进食或哺乳。婴幼儿阵咳时，应抱起轻拍背部，促使排痰，痰液粘稠难以咯出时，可雾化吸入。汤剂及中成药应饭前喂服，少量频饮，防止呕吐。避免各种可能诱发痉咳的刺激，如刺激性气味，烟尘，油腥煎炒等异味刺激。密切观察患儿呼吸、神志及痉咳发作情况。百考试题论坛 按儿童计划免疫要求，出生后3~5个月接种“白、百、破”混合制剂3针，每针间隔1个月，1岁半时加强一次。体弱者接触患儿后，可接种高效价免疫血清或百日咳免疫球蛋白，或用红霉素口服，连用10天。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)