

2011年外科护理：直肠脱垂的病因\_护士资格考试\_PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/2/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_A4\\_96\\_c21\\_2688.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_2688.htm) 直肠脱垂的病因：解剖因素，腹内

压增高因素，其他。直肠脱垂也称脱肛，是直肠黏膜或肠壁全层向下移位，脱出肛门之外。仅有直肠黏膜脱出者称为部分性脱垂，如为全层肠壁脱出者称为完全性脱垂。直肠脱垂的病因尚不完全明了，认为与下列因素有关。www.

Examda.CoM (1) 解剖因素：小儿骶骨弯曲度过小、过直，对直肠的托负力不足；盆底组织较弱，如幼儿发育不全或年老体弱盆底软组织萎缩等。(2) 腹内压增高因素：如习惯性便秘、长期慢性咳嗽、前列腺肥大、排尿困难、多次分娩、长期腹泻等，使腹内压增高，推动已松弛的直肠向下脱出。(3) 其他：内痔、直肠息肉经常脱出，向下牵拉直肠黏膜，诱发黏膜脱垂。更多信息请访问：百考试题护士网校100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问[www.100test.com](http://www.100test.com)