

2011年外科护理：门静脉高压症的病因_护士资格考试_PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_2691.htm 门静脉高压症的病因：肝内型最多

见，肝前型，肝后型。门静脉高压症的病因：来源

：www.examda.com 门静脉血流阻力的增加常是门静脉高压症

的始动因素。按阻力增加的部位可分为肝前、肝内和肝后三

型。1.肝内型最多见。此型又分为三种：窦前、窦后和窦型

。在我国，肝炎后肝硬化是引起肝窦和窦后阻塞性门静脉高

压症的常见原因。常见的肝内窦前阻塞性病因是血吸虫病，

南方多见。（1）肝硬化后，由于纤维组织的增生和肝细胞

的再生所引起的压迫，使门静脉血液回流受阻，而导致门静

脉压力增高。（2）肝硬化后，肝动脉小分支和门静脉小分

支之间的交通支大量开放，压力较高的肝动脉血直接注入门

静脉系统，使门静脉的压力更高。2.肝前型 少见，常见病因

是肝外门静脉血栓形成（脐炎、腹腔内感染如急性阑尾炎和

胰腺炎、创伤等）、先天性畸形（闭锁、狭窄或海绵窦样变

等）和外在压迫（转移癌、胰腺炎等）。预后较肝内型好。

3.肝后型 常见病因有Budd-Chiari综合征、缩窄性心包炎、严

重右心力衰竭等。更多信息请访问：百考试题护士网校

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com