2010年外科护理：局麻药中毒的预防护士资格考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_2782.htm 局麻药中毒的预防：来源：考试大

(1) 限量使用：一般不允许超过限量，尤其对耐受力低下的病人，要适当减量。(2) 限制浓度：不得超过限制浓度，尤其对年老体弱者更要加以限制。(3) 防止局麻药过快入血：即每次推药前必须回吸无血；同时在血循环丰富部位麻醉用药浓度和用量要偏小；在局麻药中加入适量的肾上腺素，通常每100ml局麻药中加入0.1%肾上腺素0.3ml，可延缓麻药的吸收，减少中毒的发生，又可延长麻醉时间，但有高血压、心脏病、甲亢、老年患者及指(趾)端手术的局麻药中忌加肾上腺素。更多信息请访问：[#0000ff>百考试题护士网校](#)
[#0000ff>护士论坛](#) [#0000ff>护士在线题库](#) [blue>护理学专业\(护士\)](#)《相关专业知识》全真模拟试汇总 [blue>护理学专业\(护士\)](#)《基础知识》全真模拟试题 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com