

2010年儿科护理：小儿百日咳的临床表现护士资格考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/2/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2010_E5_B9_B4)

[\\_E5\\_84\\_BF\\_c21\\_2839.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_2839.htm) 小儿百日咳临床表现：潜伏期平均约7~10月（2~20日）。典型临床经过分三期：1、前驱期（卡他期）从起病至阵发性痉咳的出现，约7~10日。患儿出现咳嗽、流涕；打喷嚏、低热、乏力等上呼吸道感染症状，2~3日后热退，但咳嗽日益加重，尤以夜间为甚。 www.

Examda.CoM 2、痉咳期 病人出现典型痉咳状态时为进入本期的标志，病期24周或更长。痉咳表现为突发几十声急促的咳嗽，咳至终未伴深长吸气及高音调鸡鸣样吼声，伴随粘液痰咳出或胃内容物呕出而告终。如此反复发作每日数次至数十次，日轻夜重。痉咳常因冷空气刺激、进食、烟熏或情绪波动而诱发。痉咳频繁者出现颜面浮肿、球结膜下出血（或鼻衄）、舌系带溃疡等百日咳面容。无并发症者肺部体征阴性。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)