

抗生素类抗感染药：氨基糖苷类-硫酸西索米星 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/201/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_201599.htm 【摘要】硫酸西索米星属于氨基糖苷类抗生素栏目，主要讲述了药物名称 硫酸西索米星 药物别名 紫苏霉素，西梭霉素 Extramycin

，Baymicin，Rickamicin 英文名称 Sisomicin 说明 注射剂：50mg，100mg。抗菌谱和庆大霉素相似，对金黄色葡萄球菌和克雷白杆菌、变形杆菌、肠杆菌属、绿脓杆菌、大肠杆菌、痢疾杆菌等有效。用法用量 肌注、静脉注射或静...。本文重点关注硫酸 药物 霉素 注射 等内容，您可以在本页对硫酸西索米星进行讨论【关键字】氨基糖苷类抗生素.硫酸.药物.霉素.注射.硫酸西索米星【全文】药物名称 硫酸西索米星

药物别名 紫苏霉素，西梭霉素 Extramycin，Baymicin，Rickamicin 英文名称 Sisomicin 说明 注射剂：50mg，100mg。功用作用 本品为氨基糖甙类抗生素。抗菌谱和庆大霉素相似，对金黄色葡萄球菌和克雷白杆菌、变形杆菌、肠杆菌属、绿脓杆菌、大肠杆菌、痢疾杆菌等有效。用于敏感菌所致下呼吸道感染、复杂尿路感染等。用法用量 肌注、静脉注射或静滴：成人每日3mg～6mg/kg，2～3次/日。注意事项 妊娠、哺乳期妇女、少儿慎用。有抗生素耳聋家族史的患者禁用。脑神经损害、重症肌无力、震颤麻痹等患者慎用。儿童、老年、长期用药者、肾脏功能减退患者应进行药物浓度、听力或前庭功能监测。应实现给药个体化，本品有效治疗血药浓度为4mg～10mg/L，应避免长时间超过12mg/L。肾功能障碍者应及时调整剂量。患者应足够饮水以减少肾小管损害。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com