

抗生素类抗感染药：氨基糖苷类-硫酸妥布霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/201/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_201605.htm 【摘要】硫酸妥布霉素属于氨基糖苷类抗生素栏目，主要讲述了药物名称 硫酸妥布霉素 药物别名 乃柏欣、托普霉素、妥布接霉素、妥布霉素 Nebcin，Obracine，Tobradistin 英文名称 Tobramycin 说明注射剂：20mg，40mg，80mg。用于敏感菌所致下呼吸道感染、腹腔感染、骨和软组织感染、复杂尿路感染及菌血症、脑膜炎等。儿童、老年、长期用药者、肾脏功...。本文重点关注硫酸 霉素 药物 感染 等内容，您可以在本页对硫酸妥布霉素进行讨论【关键字】氨基糖苷类抗生素.硫酸.霉素.药物.感染.硫酸妥布霉素【全文】药物名称 硫酸妥布霉素药物别名 乃柏欣、托普霉素、妥布接霉素、妥布霉素 Nebcin，Obracine，Tobradistin英文名称 Tobramycin说明注射剂：20mg，40mg，80mg；粉针剂：1g，2g。功用作用 本品为氨基糖甙类广谱抗生素，主要对革兰阴性菌，如绿脓杆菌、大肠杆菌、克雷白杆菌、肠杆菌属、变形杆菌、枸橼酸杆菌有效。肌注后吸收迅速，Tmax为0.3h，主要以原形经肾脏排出，T1/2为2h。用于敏感菌所致下呼吸道感染、腹腔感染、骨和软组织感染、复杂尿路感染及菌血症、脑膜炎等。用法用量 肌肉注射、静脉滴注：成人或儿童，每日3mg~5mg/kg，2~3次/日。疗程不宜超过10日。注意事项 妊娠C类。妊娠、哺乳期妇女慎用。有抗生素耳聋家族史的患者禁用。脑神经损害、重症肌无力、震颤麻痹等患者慎用。儿童、老年、长期用药者、肾脏功能减退患者应进行药物浓度、听力或前

庭功能监测。应实现给药个体化，本品有效治疗血药浓度为4mg ~ 10mg/L，应避免长时间超过12mg/L。肾功能障碍者应及时调整剂量。患者应足够饮水以减少肾小管损害。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com