

中药图谱大全：常山图谱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/201/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_9B_BE_E8_c23_201758.htm

【药名】：常山【拼音】：CHANGSHAN【英文名】：Antifeverile Dichroa Root

【来源】：为双子叶植物药虎耳草科植物黄常山的根。【功效】：除痰，截疟。【主治】：治疟疾，瘰疬。【性味归经】：苦辛，寒，有毒。《本经》：“味苦，寒。”《别录》：“辛，微寒，有毒。”《药性论》：“味苦，有小毒。”入肝、脾经。《雷公炮制药性解》：“入肝经。”

《药品化义》：“入脾经。”《要药分剂》：“入肺、心、肝三经。”【用法用量】：内服：煎汤，1~3钱；或入丸、散。【用药忌宜】：正气虚弱，久病体弱者忌服。《雷公炮炙论》：“勿令老人、久病服之，切忌也。”《本草经集注》：“畏玉札。”《药性论》：“忌葱。”《本草蒙筌》：“忌鸡肉。”《本草经疏》：“疟非由于瘴气及老痰积饮所致者勿用。”【别名】：互草(《本经》)、

恒山、七叶(《吴普本草》)、鸡骨常山(陶弘景)、翻胃木(侯宁极《药谱》)【处方名】：常山、生常山、鸡骨常山、黄常山、炒常山、炙常山、酒常山、醋常山、熟常山等处方中写常山、鸡骨常山、黄常山指生常山。为原药去杂质，润透切片入药者。长于涌吐。炒常山又名炙常山。为常山片用文火炒至微黄入药者。酒常山和醋常山为常山片分别用黄酒或米醋淋喷拌匀，稍闷润吸尽，再用文火炒黄入药者。长于截疟。熟常山为炒常山、酒常山、醋常山的统称。【商品名】：常山、黄常山、鸡骨常山，以质坚体重、断面淡黄色、干燥

无杂质者为佳。【药用部位】：本植物的嫩枝叶(蜀漆)亦供药用，另详专条。【动植物资源分布】：分布江西、湖北、湖南、陕西、四川、贵州、云南、广东、广西、福建等地。药材主产于四川、贵州、湖南。此外，湖北、广西亦产。【药材的采收与储藏】：秋季采挖，除去茎苗及须根，洗净，晒干。【拉丁名】：药材Radix Dichroae 原植物Dichroa febrifuga Lour【炮制方法】：常山：拣去杂质，以水略浸泡后捞出，润透，切片，晒干。酒常山：取常山片用黄酒拌匀，稍闷润，置锅内用文火炒至略呈黄色，取出放凉。(每常山片100斤用黄酒10~20斤)醋常山：取常山片用米醋拌炒如上法。(每常山片100斤用米醋10~20斤) 《雷公炮炙论》：“凡使常山，春采根叶，酒浸一宿，至明漉出，日干，熬捣。” 《医学入门》：“常山生用令人大吐，酒浸一日蒸熟或炒，或醋浸煮熟，则化痞而不吐”【考证】：出自《神农本草经》。陶弘景：“常山，出宜都、建平，细实黄者，呼为鸡骨常山，用最胜。” 《本草图经》：“常山，今京西、淮、浙、湖南州郡亦有之。海州出者，叶似楸叶，八尺，有花红白色，子碧色，似山楝子而小。五月采叶，八月采根，阴干。此二味为治疟之最要。”【生药材鉴定】：干燥的根圆柱形，常分歧，弯曲扭转，长10~15厘米，直径约0.3~2厘米。表面黄棕色，有明显的细纵纹及支根痕迹，栓皮易剥落，显出淡黄色木质部。质坚硬，折断时有粉飞出。横断面黄白色，用水湿润后可见明显的类白色射线，放射状排列。根茎类圆柱形而近块状。横断面除中央有髓外，其他均与根的横断面相同。气微弱，味苦。以质坚实而重、形如鸡骨，表面及断面淡黄色、光滑者为佳，根粗长顺直、质松、色

深黄、无苦味者不可入药。显微鉴定：根横切面：木栓层为数列木栓细胞。皮层甚薄，少数细胞含树脂块或草酸钙针晶束。韧皮部较窄，薄壁细胞含树脂或针晶束；韧皮射线宽1 - 9细胞，以3 - 6细胞为多见。形成层成环。木质部占根的绝大部分，导管多角形，直径24-60 μm ，常单个散在或数个径向排列，导管内时有黄色类圆形的侵填体；木纤维小，壁强木化；木薄壁细胞多角形，壁木化；木射线宽2 - 9列细胞，细胞类方形。本品薄壁细胞含淀粉粒。粉末：淡黄色淀粉粒单粒类圆形、类椭圆形或长圆形，直径3-14 μm ，脐点、层纹均不明显；复粒较少，由2 - 3分粒组成。草酸钙针晶多成束存在于长梭形或长圆形细胞中，针晶长约至80 μm 。木薄壁细胞类多角形或长多角形，壁稍厚，呈连珠状，纹孔细点状，较密。木纤维细长，直径12-40 μm ，壁稍厚，纹孔稍疏，细小。梯状具缘纹孔导管直径约25 μm 。此外，可见树脂块、残存的木栓细胞。【中药化学成分】：根含总生物碱约0.1%，其中有常山碱（常山碱乙，febrifugin, -dichroine）、异常山碱（常山碱甲，isofebrifugin, -dichroine）及常山碱丙（-dichroine），为抗疟有效成分。另含常山次碱（dichroidine）、4-喹唑酮（4-quinazolone）及一种吸湿性生物碱。此外。尚含有两种中性物质：伞形花内酯（常山素A，unbeliferone, dichrin A, 7-hydroxycoumarin）、常山素B（dichrin B）。【中药化学鉴定】：取本品粗粉2g，加乙醇10ml，水浴上回流提取15min，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加盐酸2ml溶解并滤过。取滤液滴加碘化铋钾试液1-2滴，立即有棕红色沉淀发生。（示生物碱）

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

