

抗生素类抗感染药：大环内酯类-依托红霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/202/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E7\\_94\\_9F\\_E7\\_B4\\_A0\\_E7\\_c23\\_202677.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/202/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_202677.htm) 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】依托红霉素属于大环内酯类抗生素栏目，主要讲述了药物名称 依托红霉素 药物别名 无味红霉素、Estolate 英文名称 Erytrom 说明片剂：0。颗粒剂：75m 功用作用 1．本品作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药：溶血性链球菌、肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎。 5．其他衣原体属、支原体属所致泌尿生殖系感染。 ...。本文重点关注依托红霉素患者感染等内容，您可以在本页对依托红霉素进行讨论【关键字】大环内酯类抗生素.依托.红霉素.患者.感染.依托红霉素【全文】药物名称 依托红霉素 药物别名 无味红霉素、Estolate 英文名称 Erytrom 说明片剂：0.125g；胶囊：0.05g、0.125g；颗粒剂：75m 功用作用 1．本品作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药：溶血性链球菌、肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎；溶血性链球菌所致的猩红热、蜂窝织炎；白喉及白喉带菌者；气性坏疽、炭疽、破伤风；放线菌病；梅毒；李斯特菌病等。 2．军团菌病。 3．肺炎支原体肺炎。 4．肺炎衣原体肺炎。 5．其他衣原体属、支原体属所致泌尿生殖系感染。 6．沙眼衣原体结膜炎。 7．厌氧菌所致口腔感染。 8．空肠弯曲菌肠炎。 9．百日咳。 10．风湿热复发、感染性心内膜炎（风湿性心脏病、先天性心脏病、心脏瓣膜置换术后）、口腔、上呼吸道医疗操作时的预防用药（青霉素的替代用药）。 用法用量 以红霉素碱基计。口服：成

人，1g～2g/日，3～4次/日；儿童，每日30mg～50mg/kg，3～4次/日。应及时停药给予对症和支持治疗。血或腹膜透析后极少被消除。注意事项 妊娠B类，妊娠和哺乳期妇女慎用，过敏者禁用，有肝病史或肝功失常患者慎用。本品不宜单独用于严重葡萄球菌感染。不宜肌内注射给药，滴注速度宜慢。红霉素片剂为肠溶片，不可嚼碎。腹膜透析和血液透析不能清除本品。

1. 服用本品后出现ALT、AST、AKP、胆红素等增高者较服用其他红霉素制剂为多见。
2. 溶血性链球菌感染用本品治疗时，至少需持续10日，以防止急性风湿热的发生。
3. 肾功能减退患者一般无需减少用量。
4. 患者对一种红霉素制剂过敏或不能耐受时，对本品也可过敏或不能耐受。
5. 慢性肝病、肝功能损害者慎用。
6. 因不同细菌对红霉素的敏感性存在一定差异，故应做药敏测定。
7. 对诊断的干扰：红霉素可干扰Higerty法的荧光测定，使尿儿茶酚胺的测定值出现假性增高。血清碱性磷酸酶、胆红素、丙氨酸氨基转移酶和门冬氨酸氨基转移酶的测定值均可能增高。

孕妇及哺乳期妇女用药

1. 本品可通过胎盘而进入胎儿循环，且孕妇服用本品后出现肝毒性反应的可能性增加，故孕妇不宜应用。
2. 红霉素有相当量进入母乳中，哺乳期妇女应用时宜暂停哺乳。

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)