抗生素类抗感染药:氨基糖苷类-异帕沙星注射液 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/202/2021_2022__E6_8A_97_ E7 94 9F E7 B4 A0 E7 c23 202678.htm 药师资格考试训练软 件《百宝箱》【摘要】异帕沙星注射液属于氨基糖苷类抗生 素栏目,主要讲述了药物名称异帕沙星注射液药物别名硫 酸异帕米星 Isepamicin Sulfate、Isp 英文名称 Exacin Ingection 说 明注射剂:每支200mg。400mg 功用作用本品氨基糖甙类为 抗生素,通过抑制细菌蛋白质的合成而起杀菌作用。其特点 是对氨基糖甙系列抗生素修饰酶,比其他同类药物稳定,耐 药菌少,交...。本文重点关注注射液 药物 氨基 抗生素 等内容 , 您可以在本页对异帕沙星注射液进行讨论【关键字】氨基 糖苷类抗生素.注射液.药物.氨基.抗生素.异帕沙星注射液【全 文 】药物名称 异帕沙星注射液药物别名 硫酸异帕米星 Isepamicin Sulfate、Isp英文名称 Exacin Ingection说 明 注射剂: 每支200mg; 400mg功用作用本品氨基糖甙类为抗生素,通过 抑制细菌蛋白质的合成而起杀菌作用。其特点是对氨基糖甙 系列抗生素修饰酶,比其他同类药物稳定,耐药菌少,交叉 耐药性也少。抗大肠杆菌、柠檬酸菌属、克雷伯氏杆菌属、 肠菌属、克雷氏菌属、变形杆菌属和绿脓杆菌中,对庆大霉 素有耐药性,而本品对败血症、外伤、烧伤和手术后伤口表 皮的二次感染、慢性支气管炎、肺炎、肾盂肾炎、膀胱炎、 腹膜炎等有效。 用法用量 肌注:一次200mg,每日2次;静滴 ;一次400mg,用5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液稀释 后,缓慢滴注,每日1次。注意事项 凡对本品及其他氨基 糖甙类抗生素及杆菌肽有过敏症病史者禁用; 孕妇、新生

儿早产儿及肝肾功能不全者慎用; 避免与葡聚糖、藻酸钠等血浆代用品、麻醉剂、肌松剂、利尿剂等合用,以免加强肾毒性和耳聋。转贴于:100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com