

抗生素类抗感染药：氨基糖苷类-注射用双去氧卡那霉素B

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/202/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_202679.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】注射用双去氧卡那霉素B属于氨基糖苷类抗生素栏目，主要讲述了 药物名称 注射用双去氧卡那霉素B 药物别名 硫酸双去氧卡那霉素、地贝卡星、达苳霉素。英文名称 Dibekacin BVial 说明 功用作用 本品为卡那霉素衍生物，抗菌谱和庆大霉素相似，对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有杀菌作用。其特点是对绿脓杆菌、变形杆菌和对多种药物耐药的大肠杆菌、...。本文重点关注注射 卡那霉素 药物感染 等内容，您可以在本页对注射用双去氧卡那霉素B进行讨论【关键字】氨基糖苷类抗生素.注射.卡那霉素.药物.感染.注射用双去氧卡那霉素B【全文】药物名称 注射用双去氧卡那霉素B药物别名 硫酸双去氧卡那霉素、地贝卡星、达苳霉素。英文名称 Dibekacin BVial说明 功用作用 本品为卡那霉素衍生物，抗菌谱和庆大霉素相似，对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有杀菌作用。其特点是对绿脓杆菌、变形杆菌和对多种药物耐药的大肠杆菌、肺炎肝菌、葡萄球菌等有较强的抗菌作用。敏感菌所致的上呼吸道感染、败血症、泌尿系统感染、脓肿、蜂窝组织炎、腹膜炎以及手术后感染。用法用量 肌注：一般每日0.1～0.2g，分1～2次注射；静滴：一般每日0.1g，分2次滴注。用5～10%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液100～300ml溶解稀释后，缓慢滴注。注意事项 凡对氨基糖甙类抗生素或杆菌肽过敏者禁用； 孕妇或因链霉素所致听力减退者忌用； 肝肾功能不全者及老年人慎用； 不

宜与血浆代用品、麻醉药、肌松药、利尿药等合用。 转贴于
： 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com