

抗生素类抗感染药：大环内酯类-硬脂酸红霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/202/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_202680.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】硬脂酸红霉素属于大环内酯类抗生素栏目，主要讲述了药物名称 硬脂酸红霉素 药物别名 英文名称 ErythromycinStearate 说明片剂：为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显白色或类白色：0.05g (5万单位)、0.5万单位)、0.25g (25万单位)。本文重点关注硬脂红霉素 单位用药等内容，您可以在本页对硬脂酸红霉素进行讨论【关键字】大环内酯类抗生素.硬脂.红霉素.单位.用药.硬脂酸红霉素【全文】药物名称 硬脂酸红霉素药物别名 英文名称

ErythromycinStearate说明片剂：为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显白色或类白色：0.05g (5万单位)、0.125g (12.5万单位)、0.25g (25万单位)。胶囊：0.1g(10万单位)、0.125g (12.5万单位)。颗粒剂：50mg (5万单位)。功用作用 1．本品作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药：溶血性链球菌、肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎；溶血性链球菌所致的猩红热、蜂窝织炎；白喉及白喉带菌者；气性坏疽、炭疽、破伤风；放线菌病；梅毒；李斯特菌病等。 2．军团菌病。 3．肺炎支原体肺炎。 4．肺炎衣原体肺炎。 5．其他衣原体属、支原体属所致泌尿生殖系感染。 6．沙眼衣原体结膜炎。 7．淋球菌感染。 8．厌氧菌所致口腔感染。 9．空肠弯曲菌肠炎。 10．百日咳。 11．风湿热复发、感染性心内膜炎（风湿性心脏病、先天性心脏病、心脏瓣膜置换术后）、口腔、上呼吸道医疗操作时的预防用药（青霉素的

替代用药)。用法用量 口服，成人一日0.75～2g，分3～4次，儿童每日按体重20～40mg/kg，分3～4次。治疗军团菌病，成人一次0.5～1.0g，一日4次。用作风湿热复发的预防用药时，一次0.25g，一日2次。用作感染性心内膜炎的预防用药时，术前1小时口服1g，术后6小时再服用0.5g。[药物过量]应及时停药给予对症和支持治疗。血或腹膜透析后极少被消除。

注意事项 对红霉素类药物过敏者禁用。

1. 溶血性链球菌感染用本品治疗时，至少需持续10日，以防止急性风湿热的发生。
2. 肾功能减退患者一般无需减少用量。
3. 为获得较高血药浓度，红霉素需空腹（餐前1小时或餐后3～4小时）与水同服。
4. 用药期间定期随访肝功能。肝病患者和严重肾功能损害者红霉素的剂量应适当减少。
5. 患者对一种红霉素制剂过敏或不能耐受时，对其他红霉素制剂也可过敏或不能耐受。
6. 对诊断的干扰：本品可干扰Higerty法的荧光测定，使尿儿茶酚胺的测定值出现假性增高。血清碱性磷酸酶、胆红素、丙氨酸氨基转移酶和门冬氨酸氨基转移酶的测定值均可能增高。
7. 因不同细菌对红霉素的敏感性存在一定差异，故应做药敏测定。

[孕妇及哺乳期妇女用药] 1. 本品可通过胎盘而进入胎儿循环，浓度不高，文献中也无对胎儿影响方面的报道，但孕妇应用时仍宜权衡利弊。2. 本品有相当量进入母乳中，哺乳期妇女应用时应暂停哺乳。

转贴于：
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com