

抗生素类抗感染药：大环内酯类-麦白霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/202/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E7\\_94\\_9F\\_E7\\_B4\\_A0\\_E7\\_c23\\_202794.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/202/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_202794.htm) 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】麦白霉素属于大环内酯类抗生素栏目，主要讲述了药物名称 麦白霉素 药物别名 英文名称

Meleumycin 说明片剂：每片0.1g 功用作用 抗菌性能与红霉素相似，对葡萄球菌、链球菌、白喉杆菌、肺炎链球菌、百日咳杆菌、支原体等有抗菌作用。可作为红霉素的替代品，应用于敏感菌所致的口咽部、呼吸道、皮肤和软组织，胆道等部位感染。。 本文重点关注霉素 药物作用 抗菌 等内容，您可以在本页对麦白霉素进行讨论【关键字】大环内酯类抗生素.霉素.药物.作用.抗菌.麦白霉素【全文】药物名称 麦白霉素 药物别名 英文名称 Meleumycin 说明片剂：每片0.1g 功用作用 抗菌性能与红霉素相似，对葡萄球菌、链球菌、白喉杆菌、肺炎链球菌、百日咳杆菌、支原体等有抗菌作用。口服吸收后，广泛分布于各器官中，以肝、肺、脾中较高，胆汁中有很高浓度，尿中浓度很低，不能透过正常脑膜。可作为红霉素的替代品，应用于敏感菌所致的口咽部、呼吸道、皮肤和软组织，胆道等部位感染。 用法用量 1量0.8~1.2g，分3~4次服。儿童1日量30mg/kg，分3~4次服。 注意事项（1）本品与其他大环内酯类有较密切的交叉耐药性。（2）本品在pH 6.5时吸收差。过去生产肠溶衣片，血药浓度低。现改为胃溶衣片有利吸收。 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)