

抗生素类抗感染药：大环内酯类-阿奇霉素干混悬剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/202/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_202878.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】阿奇霉素干混悬剂属于大环内酯类抗生素栏目，主要讲述了药物名称阿奇霉素干混悬剂 药物别名希舒美 Zithromax 英文名称 Azithromycin for Suspension 说明本品内容物为白色或类白色混悬型颗粒剂，气芳香，味甜。每袋含阿奇霉素二水合物104.81mg，相当于阿奇霉素100mg。功用作用 敏感细菌所引起的感染：支气管炎、肺炎等下呼吸道感染。。本文重点关注霉素 感染 用于 剂量 等内容，您可以在本页对阿奇霉素干混悬剂进行讨论【关键字】大环内酯类抗生素.霉素.感染.用于.剂量.阿奇霉素干混悬剂【全文】药物名称阿奇霉素干混悬剂药物别名希舒美 Zithromax英文名称 Azithromycin for Suspension说明本品内容物为白色或类白色混悬型颗粒剂，气芳香，味甜。每袋含阿奇霉素二水合物104.81mg，相当于阿奇霉素100mg。功用作用 敏感细菌所引起的感染：支气管炎、肺炎等下呼吸道感染；皮肤和软组织感染；中耳炎；鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染。男女性传播疾病中由沙眼衣原体所致的单纯性生殖器感染。阿奇霉素亦可用于由非多重耐药淋球菌所致的单纯性生殖器感染及由杜克嗜血杆菌引起的软下疳。用法用量 每日口服药一次。溶于水中，服用前搅拌均匀。可与食物同时服用。以阿奇霉素干混悬剂治疗各种感染性疾病，其疗程及使用方法如下：对沙眼衣原体、杜克嗜血杆菌或敏感淋球菌所致的性传播疾病，仅需单次口服本品1.0g。对其他感染的治疗：

总剂量1.5g，每日一次服用本品0.5g共三天。或总剂量相同，仍为1.5g，首日服用0.5g，第二至第五日每日一次口服本品0.25g。肾功能不全患者轻度肾功能不全患者（肌酐清除率 $> 40\text{ml}/\text{min}$ ）不需调整剂量。尚无阿奇霉素用于严重肾功能不全患者资料。肝功能不全患者轻中度肝功能不全患者，本品的用法与用量同肝功能正常者。[药物过量]药物过量的不良反应与推荐剂量的相同。一旦发现超量使用，可根据病情给予对症和支持治疗。注意事项 对阿奇霉素或其它大环内酯类抗生素有过敏史的病人，禁忌使用本品。1. 与红霉素和其它大环内酯类一样，罕有严重的过敏反应报告如血管性水肿和过敏症（罕有致命性）。有些因阿奇霉素引起的反应可反复发作，需较长时间的观察和治疗。2. 尚无阿奇霉素用于肌酐清除率3. 由于肝脏是阿奇霉素排泄的主要途径，故阿奇霉素用于明显肝病患者时应慎重。4. 同其它抗生素制剂一样，应注意观察包括真菌在内的非敏感菌所致的二重感染症状。[孕妇及哺乳期妇女用药]动物生殖研究表明阿奇霉素可穿过胎盘，但对胎儿无损害迹象。尚无本品在母乳中分泌及用于妊娠和哺乳人群的安全性资料，故只有在妊娠或哺乳期妇女无适当选择余地时才可使用本品。[儿童用药]除单纯治疗链球菌性咽炎之外，儿童的总剂量为 $30\text{mg}/\text{kg}$ ，连续3天给药，每日给药一次，剂量为 $10\text{mg}/\text{kg}$ ；或连续5天给药，每日给药一次，第一天 $10\text{mg}/\text{kg}$ ，第2至第5天 $5\text{mg}/\text{kg}$ 。转贴于：
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com