

抗生素类抗感染药：大环内酯类-地红霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/202/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E7\\_94\\_9F\\_E7\\_B4\\_A0\\_E7\\_c23\\_202879.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/202/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_202879.htm) 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】地红霉素属于大环内酯类抗生素栏目，主要讲述了药物名称地红霉素药物别名 Nortron 英文名称 Dirithromycin(DRM) 说明片剂或胶囊：每片（粒）250 mg。

功用作用 本品为口服有效的具有14元内酯环的大环内酯类抗生素。本品对临床分离出的革兰阳性菌，体外抑菌活性类似于红霉素、罗红霉素、阿齐红霉素，但弱于克拉红霉素。用法...。本文重点关注红霉素 药物 口服 大环内酯 等内容，您可以在本页对地红霉素进行讨论【关键字】大环内酯类抗生素.红霉素.药物.口服.大环内酯.地红霉素【全文】药物名称地红霉素药物别名 Nortron英文名称 Dirithromycin(DRM)说明片剂或胶囊：每片（粒）250 mg。

功用作用 本品为口服有效的具有14元内酯环的大环内酯类抗生素。本品对临床分离出的革兰阳性菌，体外抑菌活性类似于红霉素、罗红霉素、阿齐红霉素，但弱于克拉红霉素。对肠球菌属的敏感性在各个研究中变化不等，但一般对肠球菌耐药。敏感的革兰阴性菌包括幽门螺杆菌及空肠螺杆菌、卡他莫拉菌、鲍特菌属（百日咳杆菌和副百日咳杆菌及某些奈瑟菌属，如淋球菌）。本品进入人体后主要聚集在中性粒细胞中，接触120min后本品在细胞内外浓度的比值达34.5。敏感菌引起的扁桃体炎、咽炎、下呼吸道及皮肤和软组织感染。用法用量 口服：500mg，每日1次，连续使用5~10d。轻至中度肝、胆或肾损伤病人不必调整剂量。 注意事项 发生率与性质类似于其它大环内酯

类抗生素，腹痛、腹泻和恶心等胃肠道反应常见。转贴于：  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)