

抗生素类抗感染药：大环内酯类-竹桃霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/202/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E7\\_94\\_9F\\_E7\\_B4\\_A0\\_E7\\_c23\\_202884.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/202/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_202884.htm) 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】竹桃霉素属于大环内酯类抗生素栏目，主要讲述了 药物名称 竹桃霉素 药物别名 英文名称

Oleandomycin 说明 注射剂：0.2g 功用作用 抗菌谱与红霉素同，抗菌活力较。与红霉素有不完整的交叉耐药性，有时可对耐红霉素的菌株有效。须口服时宜用三乙酰竹桃霉素。。

本文重点关注竹桃霉素 药物 抗菌 红霉素 等内容，您可以在本页对竹桃霉素进行讨论【关键字】大环内酯类抗生素.竹桃霉素.药物.抗菌.红霉素.竹桃霉素【全文】药物名称 竹桃霉素 药物别名 英文名称 Oleandomycin说明 注射剂：0.2g 功用作用 抗菌谱与红霉素同，抗菌活力较。与红霉素有不完整的交叉耐药性，有时可对耐红霉素的菌株有效。用法用量 1次0.2g，1日4次，肌注。1次0.4g，1日2次，加入输液中静滴。注意事项 口服不吸收。须口服时宜用三乙酰竹桃霉素。用量为0.25g，1日4次。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)