

非抗生素类抗感染药：磺胺类-磺胺多辛 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/206/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9D\\_9E\\_E6\\_8A\\_97\\_E7\\_94\\_9F\\_E7\\_c23\\_206684.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/206/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_206684.htm) 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】磺胺多辛属于磺胺类及其增效剂栏目，主要讲述了药物名称磺胺多辛 药物别名磺胺邻二甲氧嘧啶 Sulfadimoxine 英文名称 Sulfadoxine 说明片剂：0.5g 功用作用 长效磺胺药，维持血中有效浓度时间最长， $t_{1/2}$ 150小时。抗菌作用稍弱于SD，用于皮肤及软组织感染、氯气管炎及肺炎、急性扁桃体炎、咽喉炎、鼻炎、急性菌痢、尿路感染等首...。本文重点关注药物磺胺作用急性等内容，您可以在本页对磺胺多辛进行讨论【关键字】磺胺类及其增效剂.药物.磺胺.作用.急性.磺胺多辛【全文】药物名称磺胺多辛 药物别名磺胺邻二甲氧嘧啶 Sulfadimoxine 英文名称 Sulfadoxine 说明片剂：0.5g 功用作用 长效磺胺药，维持血中有效浓度时间最长， $t_{1/2}$ 150小时。抗菌作用稍弱于SD，用于皮肤及软组织感染、氯气管炎及肺炎、急性扁桃体炎、咽喉炎、鼻炎、急性菌痢、尿路感染等首剂 用法用量 1~1.5g，以后一次0.5g，每4至7日一次 注意事项 偶见恶心、头晕、头痛、药疹等，个别可有白细胞减少。严重肝肾脏疾患、早产儿、新生儿禁用转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)