

抗生素类抗感染药：多烯类-菌刻单 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/206/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_206708.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】菌刻单属于多烯类抗生素栏目，主要讲述了药物名称 菌刻单 药物别名 氨曲南 英文名称 Aztreonam 说明 注射用氨曲南：每瓶1g（效价）。功用作用 敏感菌所致的各类感染：尿路感染、下呼吸道感染、败血症、胆系腹腔感染、盆腔感染、术后伤口及烧伤等皮肤、软组织感染。亦用于治疗医院内感染中的上述类型感染(如免疫缺陷病人的医院...。本文重点关注mL 注射 感染 静脉 等内容，您可以在本页对菌刻单进行讨论【关键字】多烯类抗生素.mL.注射.感染.静脉.菌刻单【全文】药物名称 菌刻单 药物别名 氨曲南 英文名称 Aztreonam 说明 注射用氨曲南：每瓶1g（效价）。内含精氨酸0.78g（稳定、助溶用）。功用作用 敏感菌所致的各类感染：尿路感染、下呼吸道感染、败血症、胆系腹腔感染、盆腔感染、术后伤口及烧伤等皮肤、软组织感染。亦用于治疗医院内感染中的上述类型感染(如免疫缺陷病人的医院内感染)。用法用量 尿路感染 500 mg - 1 g/次，中重度感染 1 - 2 g/次，危及生命或绿脓杆菌严重感染 2 g/次。以静脉滴注、静脉注射或肌肉注射给药，单次剂量大于1 g应静脉给药。最高剂量：8 g/日。肌酐清除率小于5 mL/分或血肌酐值大于10 mg/dl的肾功能衰竭者，可首剂静注30 mg/kg体重，以后按7.5 mg/kg体重的剂量，每6 hr重复给药。如进行血液透析，则每次透析后再加用3.5 mg/kg体重，而腹膜透析患者每日再加用30 mg/kg体重。静脉滴注：每瓶以至少3 mL注射用水冲溶

，再稀释于适当液体中(生理盐水、5%或10%葡萄糖液或林格氏液)，滴注时间20 - 60分钟。静脉推注：每瓶以6 - 10 mL注射用水冲溶后，于3 - 5分钟内缓慢注入静脉。肌肉注射：每瓶以至少3 mL注射用水或氯化钠注射液稀释，深部肌肉注射。注意事项 妊娠B类。妊娠、哺乳期妇女慎用。过敏者禁用。肾功能衰竭时应调整剂量和给药间隔时间。过敏体质及对其它β-内酰胺类抗生素(如青霉素、头孢菌素)有过敏反应者慎用。对妊娠和哺乳的影响 本品能通过胎盘进入胎儿循环，动物实验显示对胎儿无影响，无毒性及致畸作用，但孕妇只有在必要时方可使用。本药可经乳汁分泌，浓度不及母体血浓度的1%，但哺乳妇女使用时应暂时停止哺乳。对儿童的影响 婴幼儿用药的安全性尚未建立。对老年人的影响 老年人用药剂量应按其肾功能减退的情况酌情减量，其肾功能的衡量以肌酐清除率为准。对氨曲南有过敏史者。 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com