

非抗生素类抗感染药：磺胺类-磺胺米隆 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/207/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_207100.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】磺胺米隆属于磺胺类及其增效剂栏目

，主要讲述了 药物名称 磺胺米隆 药物别名 甲磺灭脓， Sulfamylon 英文名称 Mafenide 说明 功用作用 抗菌谱广，对多种革兰阴性及阳性菌都有效，对绿脓杆菌有较强作用。不受脓液、坏死组织、对氨苯甲酸等的影响，并能迅速渗入创面及焦痂，因此局部应用于烧伤感染及化脓创面较为适宜。缺点是：应用时局部...。本文重点关注磺胺作用创面应用等内容，您可以在本页对磺胺米隆进行讨论【关键字】磺胺类及其增效剂.磺胺.作用.创面.应用.磺胺米隆【全文】药物名称 磺胺米隆 药物别名 甲磺灭脓， Sulfamylon 英文名称 Mafenide 说明 功用作用 抗菌谱广，对多种革兰阴性及阳性菌都有效，对绿脓杆菌有较强作用。不受脓液、坏死组织、对氨苯甲酸等的影响，并能迅速渗入创面及焦痂，因此局部应用于烧伤感染及化脓创面较为适宜。缺点是：应用时局部可出现疼痛、烧灼感，有时还可能引起过敏反应。在较大创面应用时，不宜用其盐酸盐，否则可能产生酸血症，这时以采用其醋酸盐为宜。对大肠杆菌、破伤风杆菌、枯草杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎链球菌等亦有一定作用，但在血中很快灭活，故只供局部应用，一般不用于口服和注射。本品一次外用用量不应超过5g。用法用量 以5%~10%溶液湿敷或5%~10%软膏涂敷，或撒布其散剂。 注意事项 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详

细请访问 www.100test.com