

非抗生素类抗感染药：磺胺类-酮康唑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/219/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c67_219899.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】酮康唑属于磺胺类及其增效剂栏目，

主要讲述了药物名称 酮康唑 药物别名 英文名称 Ketoconazole 说明片（胶囊）剂：每片（胶囊）200mg。功用作用 本品可抑制真菌细胞膜麦角甾醇的生物合成，影响细胞膜的通透性，而抑制其生长。对皮肤真菌、酵母菌和一些深部真菌有效。还有抑制孢子转变为菌丝体的作用，可防止进一步感染。

。本文重点关注酮康唑 真菌 感染 白色念珠菌 等内容，您可以在本页对酮康唑进行讨论【关键字】磺胺类及其增效剂.酮康唑.真菌.感染.白色念珠菌.酮康唑【全文】

药物名称 酮康唑 药物别名 英文名称 Ketoconazole 说明片（胶囊）剂：每片（胶囊）200mg。混悬液：2%。霜剂：2%。功用作用 本品可抑制真菌细胞膜麦角甾醇的生物合成，影响细胞膜的通透性，而抑制其生长。对皮肤真菌、酵母菌和一些深部真菌有效。还有抑制孢子转变为菌丝体的作用，可防止进一步感染。

。一次口服本品200mg后1~2小时内血浆平均峰值为3.5 μg/ml。本药自血浆中消除呈两相， $t_{1/2}$ （）为10小时， $t_{1/2}$ （）为8小时。临床用于治疗表皮和深部真菌病，包括皮肤和指甲癣（局部治疗无效者）、胃肠道酵母菌感染、局部用药无效的阴道白色念珠菌病，以及白色念珠菌、类球孢子菌、组织胞浆菌等引起的全身感染。尚可用于预防白色念珠菌病的再发，以及由于免疫功能低下而引起的真菌感染。可降低血清睾酮水平，可用于前列腺癌的缓解疗法。用法用量

一般感染的用量为：1日200mg，顿服，在餐间服用吸收最好。直到症状消失，微生物培养结果阴性为止。通常疗程为：真菌性口炎10天；皮肤和毛发真菌病1~2月；曲菌病和全身白色念珠菌病1~2月；类球孢子病和组织胞浆菌病2~6月；球孢子病、甲癣和慢性粘膜皮肤白色念珠菌病可长达6~12月。当疗效不好时也可加倍量，即1日400mg，顿服。阴道白色念珠菌病：1次400mg，1日2次，连用5日。儿童用量为：1~4岁，每日50mg；5~12岁，每日100mg。前列腺癌：1日量为800~1200mg。注意事项（1）吸收和胃液的分泌密切相关，因此不宜与抗酸药、抗胆碱药或H₂-阻滞药合用。如必须服上述药物，则在服本品至少2小时后再用。（2）很少渗入脑脊液，不适用于霉菌性脑膜炎。（3）有恶心、瘙痒、呕吐、腹痛、头痛、嗜眠等反应。本品在国内应用曾引起肝损害数十例，一开始表现为胃纳不佳，恶心等类似传染性肝炎症状，及时停药可恢复。少数患者仍继续服药，导致肝损害发展，并在停药后继续恶化，造成数名死亡。故应在用药期间监测肝功能。有肝病史者禁用本品。（4）妊娠禁用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com