

非抗生素类抗感染药：磺胺类-氯法齐明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/219/2021_2022_E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c67_219910.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】氯法齐明属于磺胺类及其增效剂栏目，主要讲述了药物名称 氯法齐明 药物别名 氯苯吩嗪，LAMPRENE，B-663 英文名称 Clofazimine 说明 胶丸（油蜡或聚乙二醇基质）：每丸50mg。功用作用 对麻风杆菌和其他的一些分支杆菌有抑菌作用。口服吸收不完全，吸收程度与药物粒度和剂型密切相关。有约1%的药物由尿排出，有少量药物自汗腺、乳腺和...。本文重点关注齐明 药物 麻风 反应 等内容，您可以在本页对氯法齐明进行讨论【关键字】磺胺类及其增效剂.齐明.药物.麻风.反应.氯法齐明【全文】药物名称 氯法齐明药物别名 氯苯吩嗪，LAMPRENE，B-663英文名称 Clofazimine说明 胶丸（油蜡或聚乙二醇基质）：每丸50mg。功用作用 对麻风杆菌和其他的一些分支杆菌有抑菌作用。口服吸收不完全，吸收程度与药物粒度和剂型密切相关。吸收后，迅速进入各组织，在血流中浓度甚低，自组织中释放很慢，其消除半衰期约为70天。有约1%的药物由尿排出，有少量药物自汗腺、乳腺和皮脂腺排出。对于瘤型麻风和其他型麻风均有一定疗效，对耐砜类药物麻风杆菌感染也有效。虽然尚未发现对本品的耐药菌，但在一般情况下，应与氨苯砜联合应用。还可与利福平或乙硫异烟胺联合应用以制服耐砜类药物的菌。还对麻风反应有一定疗效，可用于因用其他药物而引起急性麻风反应的病例。此外，尚对慢性盘状红斑狼疮、掌脓疱角化病、皮肤溃疡，坏疽性脓皮病也有一定疗

效。用法用量 口服。对麻风病，每日100mg；对麻风反应，1日200～400mg，麻风反应控制后，逐渐减量至每日100mg。

注意事项 (1) 本品蓄积于皮肤及角膜，可显红色或棕色，并使尿、痰、汗液显红色，少数病人并可发生光敏反应。

(2) 可发生恶心、呕吐和腹泻症状，与剂量大小密切有关。

(3) 本品可通过胎盘与进入乳汁，使新生儿和哺乳儿皮肤染色。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com