

非抗生素类抗感染药：磺胺类-醋氨苯砒 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/219/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9D\\_9E\\_E6\\_8A\\_97\\_E7\\_94\\_9F\\_E7\\_c67\\_219911.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/219/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c67_219911.htm) 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】醋氨苯砒属于磺胺类及其增效剂栏目

，主要讲述了药物名称醋氨苯砒 药物别名 二乙酰氨苯砒，Diacetyldiamino diphenylsulfone，DADDS 英文名称

Acedapsone 说明油注射液：每支225mg（1.5ml）。450mg（3ml）。900mg（6ml）。本文重点关注ml 药物作用 麻风

等内容，您可以在本页对醋氨苯砒进行讨论【关键字】磺胺类及其增效剂.ml.药物.作用.麻风.醋氨苯砒【全文】药物名

称 醋氨苯砒 药物别名 二乙酰氨苯砒，Diacetyldiamino diphenylsulfone，DADDS 英文名称 Acedapsone 说明油注射液

：每支225mg（1.5ml）；450mg（3ml）；900mg（6ml）。

为40%苯甲酸苄酯及60%蓖麻油的混悬剂。用前振摇均匀，用粗针头吸出、注入臀肌。功用作用在体内缓慢地分解成氨

苯砒或乙酰氨苯砒而起抗麻风作用。本品具长效作用，注射一次可维持60~75天。用于各型麻风病。用法用量肌注，1

次0.225g，隔60~75天注射1次，疗程长达数年。为了防止长期单用本品导致细菌产生耐药性，可在用药期间加服氨苯

砒0.1~0.15g，每周2次。注意事项（1）常见的反应有恶心、呕吐等，偶见头痛、头晕、心动过速等。初次注射有较强的疼痛感，连续应用可望减轻。（2）血液系统反应有白细胞

减少、粒细胞缺乏、贫血等。对于贫血，轻症可服用铁剂。严重反应应及时停药。葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏者，用本品可致正铁血红蛋白血症，严重者可致溶血性贫血

者，用本品可致正铁血红蛋白血症，严重者可致溶血性贫血

。（3）砷类化合物治疗麻风偶可引起“麻风反应”，常于用药后1~4周发生，特征是发热、不适、剥脱性皮炎、肝坏死并发黄疸、淋巴结肿大、贫血、正铁血红蛋白血症等，停药并给予皮质激素治疗可望好转。（4）中毒性精神病、周围神经炎等也偶发生。（5）肝、肾功能不全，贫血，胃和十二指肠溃疡病及有精神病史者慎用。（6）本品与磺胺类药物可有部分交叉过敏反应发生。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)