

非抗生素类抗感染药：磺胺类-氨苯砒 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/219/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9D\\_9E\\_E6\\_8A\\_97\\_E7\\_94\\_9F\\_E7\\_c67\\_219912.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/219/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c67_219912.htm)

药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】氨苯砒属于磺胺类及其增效剂栏目，主要讲述了100mg 功用作用 对麻风杆菌有抑制作用。口服吸收缓慢而完全，每日服用200mg，经过8日血药浓度平均2。

短半衰期者，口服本品每日50~100mg，其血浓度也可超过常需的最低抑菌浓（MIC）。主要用于治疗各型麻风。。本文重点关注麻风口服治疗反应等内容，您可以在本页对氨苯砒进行讨论【关键字】磺胺类及其增效剂.麻风.口服.治疗.反应.氨苯砒【全文】

药物名称 氨苯砒药物别名  
Diaminodiphenylsulfone，DDS英文名称 Dapsone说明片剂：每片50mg；100mg功用作用 对麻风杆菌有抑制作用。口服吸收缓慢而完全，每日服用200mg，经过8日血药浓度平均2.3  $\mu\text{g}/\text{ml}$ ， $t_{1/2}$ 因人不同，由10至50小时，平均为28小时，但在同一人身上，重复试验的结果是相等的。短半衰期者，口服本品每日50~100mg，其血浓度也可超过常需的最低抑菌浓（MIC）。由于本品存在肠肝循环，所以半衰期较长，停药后可维持有效组织浓度2~3周。主要用于治疗各型麻风。近年试用本品治疗系统性红斑狼疮、痤疮、银屑病、带状疱疹等。用法用量 治疗麻风病，口服，1次50~100mg，1日100~200mg。可于开始每日口服12.5~25mg，以后逐渐加量到每日100mg。由于本药有蓄积作用，故每服药6日后停药1日，每服10周停药2周。必要时可与利福平每日600mg，联合应用。儿童剂量1日1.4mg/kg。治疗红斑狼疮，1日100mg，连用3

~ 6月；痤疮，1日50mg；银屑病或变应性血管炎，1日100~ 150mg；带状疱疹，1日3次，1次25mg，连服3~ 14日；糜烂性扁平苔癣，1日50mg，连用3个月。以上治疗中，均遵循服药6日，停药1日的原则 注意事项（1）常见的反应有恶心、呕吐等，偶见头痛、头晕、心动过速等。（2）血液系统反应有白细胞减少、粒细胞缺乏、贫血等。对于贫血，轻症可服用铁剂。严重反应应及时停药。葡萄糖-6-磷酸脱氢酶

（G6PD）缺乏者，用本品可致正铁血红蛋白血症，严重者可致溶血性贫血。（3）砷类化合物治疗麻风偶可引起“麻风反应”，常于用药后1~ 4周发生，特征是发热、不适、剥脱性皮炎、肝坏死并发黄疸、淋巴结肿大、贫血、正铁血红蛋白血症等，停药并给予皮质激素治疗可望好转。（4）中毒性精神病、周围神经炎等也偶发生。（5）肝、肾功能不全，贫血，胃和十二指肠溃疡病及有精神病史者慎用。（6）本品与磺胺类药物可有部分交叉过敏反应发生。100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)