

07年临床助理医师考试模拟试卷一第二单元 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/220/2021_2022_07_E5_B9_B4_E4_B8_B4_E5_BA_c67_220192.htm 执业医师专用训练软件《百宝箱》

2007年临床助理医师考试模拟试卷一答案模拟试卷一第二单元A1型题1. 不可以进行骨髓移植治疗的血液病是A. 再生障碍性贫血B. 自身免疫性贫血C. 霍奇金病D. 骨髓异常增生综合征E. 多发性骨髓瘤2. 有关紫癜正确的是A. 皮肤出现红色或暗红色斑，一般高于皮肤表面B. 皮肤出现红色或暗红色斑，发生的充血现象C. 皮肤出现红色或暗红色斑，压之不褪色D. 皮肤出现红色或暗红色斑，愈后可有皮肤脱屑E. 皮肤出现红色或暗红色斑，可伴有关节腔出血3. 嗜酸性粒细胞增多诊断标准A. $>4.0 \times 10^9 / L$ B. $>3.0 \times 10^9 / L$ C. $>2.0 \times 10^9 / L$ D. $>1.0 \times 10^9 / L$ E. $>0.5 \times 10^9 / L$ 4. 血小板生成减少的出血性疾病为A. 特发性血小板减少性紫癜B. 脾功能亢进C. 再生障碍性贫血D. 过敏性紫癜E. 血小板生成减少的出血性疾病5. 导致肾盂肾炎常见的致病菌为A. 克雷白杆菌B. 大肠埃希菌C. 变形杆菌D. 葡萄球菌E. 粪链球菌6. 鉴别慢性肾盂肾炎与慢性肾小球肾炎有效的是A. 血尿程度B. 蛋白尿程度C. 肾功能减退程度D. 影像检查示一侧肾缩小或表面凹凸不平E. 高血压程度7. 下列哪项属慢性肾功能不全失代偿期(氮质血症期)A. $GFR > 50 \text{ ml/min}$ $Cr_{24} < 178 \mu\text{mol/L}$ (B. $GFR < 178 \mu\text{mol/L}$ ($> 2 \text{ mg/dl}$)C. $GFR < 45 \mu\text{mol/L}$ ($> 5 \text{ mg/dl}$)D. $GFR < 60 \mu\text{mol/L}$ ($> 3 \text{ mg/dl}$)E. $GFR < 10 \text{ ml/min}$ $Cr_{24} > 884 \mu\text{mol/L}$ ($> 10 \text{ mg/dl}$)8. 在我国引起慢性肾功能衰竭最常见的原因是A. 慢性肾小球肾

炎B．慢性肾盂肾炎C．遗传性肾小球肾炎D．糖尿病肾病E．高血压肾病9．对区分急、慢性肾功能衰竭最有意义的是A．蛋白尿程度B．血尿程度C．肾脏体积的大小D．氮质血症程度E．酸中毒程度10．尿毒症心血管系统表现中不常见A．高血压B．心内膜炎C．心力衰竭D．心律紊乱E．心包炎11．抗利尿激素在下列哪一部位合成A．腺垂体B．神经垂体C．垂体柄D．下丘脑E．肾12．属类固醇激素的是A．促肾上腺皮质激素B．肾上腺皮质激素C．肾上腺髓质激素D．促甲状腺激素E．甲状腺激素13．甲状腺功能亢进症最常见于A．碘甲亢B．甲状腺炎伴甲亢C．毒性弥漫性甲状腺肿D．多结节性甲状腺肿伴甲亢E．自主性高功能甲状腺结节14．硫脲类抗甲状腺药可引起的严重不良反应是A．粘液性水肿B．心动过缓C．粒细胞缺乏症D．低蛋白血症E．再生障碍性贫血15．1型和2型糖尿病鉴别时下列临床特征以何为主A．年轻与年老B．消瘦与肥胖C．有无自发性酮症倾向D．有无明显“三多一少”症状E．并发症的多少与严重程度16．等渗性脱水患者，大量输入生理盐水治疗可导致A．高钾血症B．低钾血症C．高氯血症D．高钙血症E．低氯血症17．下列叙述正确的是A．高渗性脱水常有细胞内水肿B．等渗性脱水主要是细胞脱水C．低渗性脱水易发生休克D．重度低渗性脱水口渴极明显E．重度高渗性脱水易出现神经系统症状18．幽门梗阻所致持续呕吐可造成A．低氯高钾性碱中毒B．缺钾性酸中毒C．低氯低钾性酸中毒D．低氯高钠性碱中毒E．低氯低钾性碱中毒19．成分输血的优点不包括A．减轻输注全血所致的血液循环负担B．减少各种免疫抗体的产生C．减少传染肝炎的机会D．减少肺梗死的发生率E．节约用血，避免浪费20．所谓

有效循环血量是指A．在微循环内的总血量B．全身总血量C．单位时间内通过心血管系统进行循环的血量D．在动脉内的血量E．在静脉内的血量21．无尿期后如出现多尿期，24小时尿量增加至A．200ml以上B．250ml以上C．300ml以上D．350ml以上E．400ml以上22．循环骤停是指心脏不能搏出有效的血液供给主要脏器的需要，下列叙述哪项与其不符A．心脏完全停搏B．电机械分离，心电图有心室融合波C．心室颤动D．一侧心室颤动而另一侧心室完全停搏E．心跳微弱23．关于手术后拆线时间，下列哪一项不正确A．四肢10～20天B．下腹部5～6天C．减张缝合2周D．胸、上腹部7～8天E．头、颈部4～5天24．创伤、感染后的神经-内分泌反应，导致下列何种激素分泌减少A．胰岛素B．肾上腺素C．胰高血糖素D．去甲肾上腺素E．抗利尿激素25．破伤风患者的治疗原则是A．预防和抢救休克B．早期行气管切开术C．高压氧治疗D．应用破伤风类毒素E．清除毒素来源，中和毒素，控制和解除痉挛26．贯通伤是指A．创伤后深部体腔与外界相通B．开放性创伤C．投射物击中人体，造成一个人口和一个出口D．一般是指开放性颅脑伤E．可等同于穿透伤27．深度烧伤的临床表现，下列错误的是A．有时在大腿可见树枝状栓塞血管B．创面多有水疱C．创面痛觉迟钝D．如无感染、创面3～4周愈合E．愈合后多有增生性瘢痕28．下列烧伤急救原则中，正确的是A．凡有呼吸道烧伤，一律作气管切开B．凡有烧伤者，一律用哌替啶止痛C．热液烫伤者，不能用较干净冷水浸泡D．应就地给予清创E．立即消除烧伤原因29．恶性肿瘤诊断重要的依据是A．病程短、发展快B．肿块质硬、固定C．血清酶学及免疫学检查D．X线、放射性核素或

超声波检查E . 病理学检查30 . 乳腺癌第工期同时患者出现血尿及膀胱刺激症状 , 检查后认为是癌肿转移 , 按国际分期 , 该患者属于A . TINOMIB . T1NIM。 C . T2N。 MoD . T2N1M0E . T3N1 Mo 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com