

非抗生素类抗感染药：磺胺类-对氨基水杨酸钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/220/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c67_220202.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】对氨基水杨酸钠属于磺胺类及其增效剂栏目，主要讲述了药物名称对氨基水杨酸钠 药物别名对氨基柳酸钠，PAS-Na 英文名称 Sodium Aminosalicylate 说明片剂：每片0.5g。注射用对氨基水杨酸钠：每瓶2g。功用作用对结核菌的对氨基苯甲酸合成起抑制作用因而可抑制其生长。约有50%药物在体内乙酰化，80%药物（包括代谢物）由尿排出、肾功能不良时应...。本文重点关注氨基 药物 注射 作用 等内容，您可以在本页对对氨基水杨酸钠进行讨论【关键字】磺胺类及其增效剂.氨基.药物.注射.作用.对氨基水杨酸钠【全文】药物名称 对氨基水杨酸钠 药物别名 对氨基柳酸钠，PAS-Na 英文名称 Sodium Aminosalicylate 说明片剂：每片0.5g。注射用对氨基水杨酸钠：每瓶2g；4g；6g。功用作用 对结核菌的对氨基苯甲酸合成起抑制作用因而可抑制其生长。口服吸收良好，Vd为0.23L / kg。约有50%药物在体内乙酰化，80%药物（包括代谢物）由尿排出、肾功能不良时应注意。t_{1/2}为0.5~1.5小时。本品很少单独应用，常配合异烟肼、链霉素等应用，以增强疗效并避免细菌产生耐药性。也可用于甲状腺功能亢进症。对于甲亢合并结核患者较适用，在用碘剂无效而影响手术时，可短期服本品为手术创造条件。本品尚有较强的降血脂作用。用法用量（1）口服 每次2~3g，1日8~12g，饭后服。小儿每日200~300mg / kg，分4次服。（2）静滴 每日4~12g（先从小剂量开始），以等渗氯化钠注射液或5%

葡萄糖液溶解后，配成3%~4%浓度滴注。小儿每日200~300mg/kg。（3）胸腔内注射 每次10%~20%溶液10~20毫升（用等渗氯化钠注射液溶解）。（4）甲亢手术前1日8~12g，分4次服，同时服用维生素B、C。服药时间不可过长，以防毒性反应出现。注意事项（1）恶心、呕吐、食欲不振、腹泻、腹痛较多见，饭后服或与碳酸氢钠同服可减轻症状。（2）偶见皮疹、剥脱性皮炎、药热、结晶尿、蛋白尿、白细胞减少、肝损害、黄疸，应即停药。（3）肝肾功能减退者慎用。（4）静滴一般用于结核性脑膜炎等严重病例，应在避光下（在滴瓶外面用黑纸包上）在5小时内滴完，变色后不可再用。（5）忌与水杨酸类同服，以免胃肠道反应加重及导致胃溃疡。（6）能干扰利福平的吸收，故与之同用时，两者给药时间最好间隔6~8小时。（7）肠溶片可减轻胃肠道反应。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com