

07年执业医师考试口腔医师A3\_A4型考题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/222/2021\\_2022\\_07\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_c22\\_222713.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022_07_E5_B9_B4_E6_89_A7_E4_B8_c22_222713.htm) 执业医师专用训练软件《百宝箱》口腔执业医师部分A3 / A4型题（1~3题共用题干）

男，19岁，患病一周，牙龈乳头坏死，前牙唇侧明显，坏死形成溃疡处凹陷，表面灰白色假膜，触之出血明显，口腔有腐性口臭。体温37.8~C，颌下淋巴结肿痛，既往未出现全身明显异常现象。1. 有辅助诊断意义的检查是A. 白细胞分类B. 脱落细胞检查C. 革兰染色涂片D. X线片E. 组织病理2. 预计检查后异常表现在A. 中性粒细胞减少B. 细胞核分化异常C. 螺旋体和梭形杆菌数量明显增力口D. 牙槽骨不同程度吸收E. 龈坏死表现3. 在局部处理同时，选择全身最佳用药是A. 四环素B. 青霉素C. 金霉素D. 卡那霉素E. 甲硝唑标准答案：1. C；2. C；3. E试题难度：1. 中；2. 易；3. 中认知层次：综合应用解析：选析第1、3题1题：题干的病例表现是典型的急性坏死性龈炎表现，而且既往未出现全身明显异常现象，可排除白血病，因此，对急性坏死性龈炎具辅助诊断意义的检查是答案C，革兰染色涂片。3题：题干病例表现符合急性坏死性龈炎，主要致病微生物是梭形杆菌和螺旋体，为厌氧微生物，甲硝唑是抗厌氧微生物的最佳药物。因此，在局部处理同时，若需全身用药，则最佳用药是甲硝唑。四环素及青霉素只能防止继发感染，不是最佳选择药物。（4~6题共用题干）女，48岁，有口腔粘膜粗涩感，进刺激食物感疼痛半年，检查发现其舌背左右各一黄豆大小白色病损，浅淡，表面乳头消失，质软。双颊自口角至颊

脂垫尖处广泛白色角化网纹，基底充血发红。双舌缘舌腹也可见类似病损。4. 询问病史及临床检查时应注意以下几点，除了A. 皮肤有无损害B. 指(趾)甲有无病损C. 外生殖器有无病损D. 有无肺结核史E. 发病前有无精神因素5. 对该病人的诊断最可能是A. 增殖性念珠菌病B. 假膜型念珠菌病C. 皮脂腺异位D. 扁平苔藓E. 白斑6. 最恰当的治疗方案为A. 手术切除B. 长期抗真菌治疗，定期复查C. 不需治疗及随访D. 全身长期大剂量激素治疗E. 消除可能的诱因，局部激素治疗，定期复查标准答案：4. D；5. D；6. E试题难度：4. 中；5. 易；6. 易认知层次：综合应用解析：选析第4题。4题：考题知识点为扁平苔藓的临床表现。从题干得知，本病的口腔表现具有扁平苔藓的特点：本题是否定题，须选出一项与本病无关的选项。A、B、C和E都与本病有关，答案只能是D。(7~9题共用题干)男，40岁，多年来全口牙反复肿胀，曾作过多次治疗，近5~6天再次加重。检查全口牙龈肿，充血，触之出血，肿胀明显，76|67牙周袋超过5mm，压溢脓，x线检查，全口多数牙槽骨有不同程度吸收，无龋。全身乏力，饮食量比一般人大，尿量也多7. 病历采集，需要了解的是A. 出血史B. 家族史C. 药物过敏史D. 是否有糖尿病E. 是否有其他全身病8. 下列需要检查的是A. 血象B. 胸透C. 血糖D. B超检查E. 转氨酶等项肝功能检查9. 需采取的治疗是A. 牙周治疗B. 牙周局部治疗，同时控制血糖C. 牙周局部治疗加全身抗生素D. 全身使用抗生素E. 全身抗生素使用及控制血糖，标准答案：7. D；8. C；9. B试题难度：7. 易；8. 易；9. 中认知层次：综合应用解析：选析第9题。9题：题干所给病例为典型的牙周炎表现，同时，全身乏

力，饮食量大，尿量多为糖尿病的表现，因此该病例为牙周炎伴糖尿病（教科书中称为糖尿病型牙周炎），故采取的治疗应为牙周局部治疗，同时控制血糖。全身抗生素使用只能暂时控制急性牙周炎症，是牙周炎的辅助疗法，而不能治疗牙周炎，所以，备选答案E不正确。部分考生知识掌握不牢受到此项干扰而丢分。（10~13题共用题干）男，25岁，一年来牙龈逐渐肿大。检查发现：全口牙龈乳头及龈缘肿，上下前牙明显。龈乳头球状突起，前牙龈呈分叶状质地坚硬，略有弹性，呈粉红色，不出血，无疼痛，龈沟加深，有菌斑，无分泌，上恒部分冠折断，已作根管治疗。

10. 采集病历重点了解的是A. 出血史B. 家族史C. 癫痫病史D. 是否戴过矫正器E. 药物过敏史

11. 为进一步确诊，首先需检查项目是A. 血象B. X线片C. 探诊附着丧失情况D. 菌斑涂片检查E. 矜关系

12. 上述检查仍不能确诊，在用药史上还需了解的是A. 全身用药B. 抗癫痫药物C. 非激素类药物D. 抗厌氧菌药物E. 局部用药

13. 在治疗中，首先采取的措施是A. 停止长期服用的药物B. 手术切除C. 深刮治D. 局部加强用药E. 观察病情后，再作处理

标准答案：10. C；11. C；12. B；13. A

试题难度：10. 易；11. 难；12. 易；13. 易

认知层次：综合应用

解析：选析第11题。11题：题干病例描述的表现主要为牙龈肥大增生的表现及口腔卫生状况，未描述牙周检查中最重要的内容：牙周袋及附着丧失情况，而这对于区别牙龈病及牙周炎是极为重要的指标，因此，为进一步确诊，首先需检查探诊附着丧失情况，该患者牙龈质地、颜色无异常，也无龈出血，因此血象不是首先要检查的项目。X线片及菌斑涂片检查均不如附着丧失项目重要。大部分考生综合分

析能力及知识掌握不牢而失分。（14~17题共用题干）女，50岁，以颊粘膜粗糙感、反复刺激性疼痛就诊。检：双颊粘膜及下唇红有网状白纹，右颊及唇红损害区有少量充血区。

14. 可作为本病的诊断依据为A. 眼结膜充血B. 鼻衄史C. 皮损有Wickham纹D. 皮肤靶形红斑E. 头皮大疱及大疱形成

15. 如需明确诊断，最可靠的检查是A. 活检组织作病理检查B. 病损组织细胞培养C. 脱落细胞涂片检查D. 药物诊断性治疗E. 病损区甲苯胺蓝染色

16. 该病例最可能的诊断为A. 盘状红斑狼疮B. 多形红斑C. 口腔粘膜扁平苔藓D. 白色角化病E. 白色水肿

17. 鉴别诊断时最需与该疾病鉴别的是A. 盘状红斑狼疮B. 多形性红斑C. 口腔溃疡D. 白色海绵状痣E. 白色水肿

标准答案：14. C；15. A；16. C；17. A

试题难度：14. 易；15. 中；16. 中；17. 难

认知层次：综合应用

解析：14题：考题知识点为扁平苔藓的诊断。诊断依据依赖临床特点。题干中所述的“双颊粘膜及下唇白色网纹”符合扁平苔藓对称、多部位发生、好发于颊粘膜的特点，但下唇的白色网纹也不能排除盘状红斑狼疮的可能。因此，皮损的表现特点和部位可有助于诊断。选项A、B、D和E的皮损特点都与本题口腔粘膜病损的联系相去甚远，故应选C。

15题：考题知识点为扁平苔藓的诊断。对于扁平苔藓来说，组织病理诊断是最肯定的手段，故应选A。

16题：考题知识点为扁平苔藓的诊断。根据上两题的分析，本题的答案自然是C。

17题：考题知识点为扁平苔藓的鉴别诊断。扁平苔藓的特征性病损是粘膜白色角化条纹，选项B、C多形渗出性红斑和口腔溃疡不出现此病损，首先可排除；海绵状斑痣和白色水肿虽然是白色病损，但不是角化病损，亦可排除之，只剩下选

项A可作答案。（18~21题共用题干）女，7岁，食冷饮时左后牙感到酸痛2周，无自发痛史，检查发现颊侧深龋，龋蚀范围稍广，腐质软而湿润，易挖除，但敏感。测牙髓活力同正常牙，叩（一）18。根据上述临床表现和检查结果，拟诊断为A．慢性根尖周炎B．急性牙髓炎C．急性龋D．慢性龋E．慢性闭锁性牙髓炎

20．若充填后远期出现激发痛和自发痛，多由于A．充填物有早接触B．充填物不密合C．继发龋伴发牙髓炎D．充填物形成悬突E．未恢复接触点

标准答案：18．C；19．A；20．C；21．C  
试题难度：18．易；19．易；20．易；21．易  
认知层次：综合应用  
解析：选析第18题。

18题：该题考查的知识点是年轻恒牙龋病的诊断和治疗特点。患者7岁，下第一磨牙刚萌出一年，为年轻恒牙。该年轻恒牙深龋范围广，腐质软而湿润，易挖除，且洞底敏感等临床表现均提示患牙拟诊断为“急性龋”而非“慢性龋”；牙髓活力同正常牙和叩诊（一）则除外了牙髓炎和根尖炎的可能性。诊断为“急性龋”的患牙，治疗方案必然应考虑为“间接盖髓术”，而非其他牙髓治疗术。首次就诊时，对患牙该做的处理为“氧化锌丁香油糊剂暂封”，以观察间接盖髓术的效果；二周后无症状，再换永久充填。另外，因年轻恒牙深急性龋，软腐质可能需分次去除，不适合选择“双层垫底即刻充填”。其他干扰答案均为牙髓病的治疗方法，不适用于“急性龋”患牙。

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)