

07年临床助理医师考试模拟试卷一第一单元 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022_07_E5_B9_B4_E4_B8_B4_E5_BA_c22_222732.htm 执业医师专用训练软件《百宝箱》

2007年临床助理医师考试模拟试卷一答案模拟试卷一第一单元A1型题

1. 关于化生下列不正确的是A. 是一种适应性形态表现B. 鳞状上皮化生最为常见C. 肠上皮化生常见于萎缩性胃炎D. 机化属于间质性化生E. 化生的上皮细胞可以发生恶性转化
2. 干酪样坏死是一种特殊的A. 液化性坏死B. 湿性坏疽C. 干性坏疽D. 气性坏疽E. 凝固性坏死
3. 血管壁玻璃样变性常见于A. 恶性高血压病的细动脉B. 良性高血压病的细动脉C. 动脉粥样硬化的纤维斑块D. 肾梗死硬化的肾动脉E. 慢性肾炎时纤维化的肾小球
4. 微血栓的主要成分是A. 红细胞B. 血小板C. 血小板梁D. 白细胞E. 纤维素
5. 瘀血常见的原因中没有A. 静脉受压B. 静脉血栓形成C. 静脉栓塞D. 器质性二尖瓣膜病E. 动脉栓塞
6. 下列对炎症渗出性病变的叙述，错误的是A. 微循环首先发生血流动力学改变B. 血流变慢和血管通透性增加是渗出的必备条件C. 液体和细胞从毛细血管和细静脉渗出D. 所有渗出的白细胞都具有吞噬作用E. 渗出的液体和白细胞被称为渗出物
7. 急性炎症局部组织变红的主要原因是A. 炎症灶内炎细胞浸润B. 肉芽组织增生C. 血管扩张，血流加快D. 炎症灶内血栓形成E. 组织间隙水肿
8. 下列哪项不是恶性肿瘤A. 精原细胞瘤B. 畸胎瘤C. 黑色素瘤D. 神经母细胞瘤E. 髓母细胞瘤
9. 高血压病心脏的病变特征是A. 右心室肥大B. 右心房扩张C. 左心室向心性肥大D. 室壁瘤形成E. 乳头肌扁平
- 10.

· 执业医师法适用于A . 医疗机构中工作的人员B . 保健机构中的医务人员C . 乡村医生D . 计划生育技术服务机构的医师E . 疾病预防控制机构的医生11 . 医师亲自接产后 , 医疗机构可以出具的证明文件是A . 出生证明书B . 死亡证明书C . 健康证明书D . 医疗鉴定结论E . 死亡报告书12 . 医疗机构施行特殊检查时A . 由经治医师所在科室集体讨论后实施B . 由医疗机构负责人批准后实施C . 由经治医师决定后实施D . 征得患者同意 , 并取得其家属或关系人同意及签字后实施E . 征得患者或者其家属同意后实施13 . 慢性支气管炎最主要病因是A . 免疫功能降低B . 大气污染C . 气候因素D . 真菌感染E . 长期吸烟14 . 诊断慢支急性发作伴细菌感染的主要依据是A . 咳白色泡沫粘痰B . 咳嗽增多C . 痰量较多呈脓性D . 肺底部有细湿啰音E . 吸气延长伴哮鸣音15 . 我国引起肺心病最常见病因是A . 肺间质纤维化B . 重症肺结核C . 慢性阻塞性肺疾病D . 支气管扩张E . 原发性肺动脉高压症16 . 导致哮喘反复发作的最重要的原因是A . 气道慢性炎症B . 气道粘膜水肿C . 支气管平滑肌功能失调D . 气道内粘液栓E . 气道高反应17 . 医院内获得性肺炎 , 最常见的致病菌是A . 病毒B . 革兰阳性球菌C . 厌氧菌D . 革兰阴性杆菌E . 真菌18 . 下列哪种情况不宜做支气管造影A . 术前明确支气管扩张部位和范围B . 反复大咯血 , 胸片未见明显病变C . 病变位于左下肺反复感染不易控制D . 病变较重累及双侧肺E . 病变重且局限于右中下肺19 . 对细胞内结核菌无效的杀菌剂是A . 异烟肼B . 乙胺丁醇C . 链霉素D . 吡嗪酰胺E . 利福平20 . Ⅱ型呼吸衰竭氧疗时适宜的吸氧浓度为A . 25 % ~ 34 %B . 35 % ~ 40 %C . 41 % ~ 45 %D . 46 % ~ 50 %E . 51 % ~ 60 %21 . 关于咳嗽的描

述下列哪项正确A．只有在呼吸道感染时才能引起咳嗽B．干咳仅见于肺癌早期C．支气管扩张症咳嗽往往于清晨或夜间变动体位时加重，并伴咳痰D．中枢神经因素引起的咳嗽，是从桥脑发出冲动所致E．感染时引起的咳嗽较重，非感染因素引起的咳嗽较轻

22．与呼吸困难无明显关系的疾病包括A．肺炎B．急性胃炎C．大量腹腔积液D．急性一氧化碳中毒E．脑出血

23．血压170 / 100mmHg伴心肌梗死患者A．2级(低危)B．2级(中危)C．2级(高危)D．2级(极高危)E．3级(极高危)

24．直接引起心脏容量负荷加重的疾病为A．主动脉瓣狭窄B．主动脉瓣关闭不全C．肺动脉瓣狭窄D．高血压E．肺动脉高压

25．以下是冠心病的危险因素，除了A．年龄、性别、吸烟B．血红蛋白异常C．血脂、血压异常D．胰岛素抵抗与肥胖E．高同型半胱氨酸血症

26．可引起低血钾的药物是A．螺内酯B．依那普利C．氨苯蝶啶D．阿米洛利E．呋塞米

27．动脉粥样硬化病变最常累及哪一支冠状动脉A．左冠状动脉主干B．左冠状动脉回旋支C．左冠状动脉前降支D．右冠状动脉后降支E．右冠状动脉窦房结支

28．急性心肌梗死最常见的心律失常是A．心房颤动B．房室传导阻滞C．室性期前收缩D．窦房传导阻滞E．加速性室性自主心律

29．下列哪种情况常有震颤A．主动脉瓣关闭不全B．肺动脉瓣关闭不全C．动脉导管未闭D．二尖瓣关闭不全E．三尖瓣关闭不全

30．二尖瓣狭窄最严重的并发症是A．心房颤动B．右心衰竭C．血栓栓塞D．急性肺水肿E．感染性心内膜炎