

非抗生素类抗感染药：磺胺类-盐酸左氧氟沙星 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_222055.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】盐酸左氧氟沙星属于磺胺类及其增效剂栏目，主要讲述了药物名称 盐酸左氧氟沙星 药物别名 可乐必妥、左氟沙星、左旋氧氟沙星、乐朗 Cravid 英文名称 Levofloxacin 说明片剂100mg/片。注射剂200mg 功用作用 本品为氧氟沙星的左旋体，对于包括厌氧菌在内的革兰阳性菌和阴性菌具广谱抗菌作用。对葡萄球菌属、肺炎球菌、化脓性链球菌、溶血性链...。本文重点关注盐酸 氧氟沙星 药物 抗菌 等内容，您可以在本页对盐酸左氧氟沙星进行讨论【关键字】磺胺类及其增效剂.盐酸.氧氟沙星.药物.抗菌.盐酸左氧氟沙星【全文】药物名称 盐酸左氧氟沙星药物别名 可乐必妥、左氟沙星、左旋氧氟沙星、乐朗 Cravid英文名称 Levofloxacin 说明片剂100mg/片；注射剂200mg 功用作用 本品为氧氟沙星的左旋体，对于包括厌氧菌在内的革兰阳性菌和阴性菌具广谱抗菌作用。对葡萄球菌属、肺炎球菌、化脓性链球菌、溶血性链球菌、肠球菌属、大肠杆菌、克雷白杆菌属、沙雷杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌、流感嗜血杆菌及淋球菌等具有很强的抗菌活性。氧氟沙星的左旋体，其抗菌活性比右旋体高。用于呼吸道、泌尿道感染、外科及妇科感染如咽喉炎、支气管炎、扁桃体炎、膀胱炎、淋菌性尿道炎、胆囊炎、胆管炎、中耳炎、烧伤及细菌性菌痢疾等。用法用量 片剂成人口服，0.1g~0.2g/次，2~3次/日。注射液：成人剂量一般200mg~400mg/日，稀释后，分二次静脉滴注或遵医嘱。注意事项

对喹诺酮类药物过敏者，妊娠、哺乳期妇女、儿童及癫痫患者禁用。1、肾功能不全应减量或慎用。2、神经系统疾患者慎用。3、避免与茶碱同时使用。如需同时应用，应监测茶碱的血药浓度以调整其剂量。4、与华法令或其衍生物同时应用，应监测凝血酶原时间或其它凝血试验。5、性病患者治疗时，应进行梅毒血清学检查，以免耽误对梅毒的治疗。6、本品200mg用不低于250ml的液体稀释，静脉缓慢滴注，滴速过快易引起静脉刺激症状或中枢神经系统反应。转贴于：
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com