

非抗生素类抗感染药：磺胺类-丙硫异烟胺片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/222/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9D\\_9E\\_E6\\_8A\\_97\\_E7\\_94\\_9F\\_E7\\_c23\\_222070.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_222070.htm) 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】丙硫异烟胺片属于磺胺类及其增效剂栏目，主要讲述了 药物名称 丙硫异烟胺片 药物别名 英文名称 Protionamide Tablets 说明 本品为肠溶衣片，除去包衣后，显黄色。1g 功用作用 本品为异烟酸的衍生物，其作用机制不明，可能对肽类合成具有抑制作用。本品对结核分枝杆菌的作用取决于感染部位的药物浓度，低浓度时仅具有抑菌作用，高浓度具有...。 本文重点关注药物 作用 结核 治疗 等内容，您可以在本页对丙硫异烟胺片进行讨论【关键字】磺胺类及其增效剂.药物.作用.结核.治疗.丙硫异烟胺片【全文】 药物名称 丙硫异烟胺片 药物别名 英文名称 Protionamide Tablets 说明 本品为肠溶衣片，除去包衣后，显黄色。0.1g 功用作用 本品为异烟酸的衍生物，其作用机制不明，可能对肽类合成具有抑制作用。本品对结核分枝杆菌的作用取决于感染部位的药物浓度，低浓度时仅具有抑菌作用，高浓度具有杀菌作用。抑制结核杆菌分枝菌酸的合成。本品与乙硫异烟胺有部分交叉耐药现象。本品仅对分枝杆菌有效，本品与其他抗结核药联合用于结核病经一线药物（如链霉素、异烟肼、利福平和乙胺丁醇）治疗无效者。 用法用量 （1）成人常用量：口服，与其他抗结核药合用，一次250mg，一日2~3次。（2）小儿常用量：与其他抗结核药合用，一次按体重口服4~5mg/kg,一日3次 注意事项 （1）交叉过敏，患者对异烟肼、吡嗪酰胺、烟酸或其他化学结构相近的药物过敏者可能对本

品过敏。（2）对诊断的干扰：可使丙氨酸氨基转移酶、门冬氨酸氨基转移酶测定值增高。（3）有下列情况时慎用：糖尿病、严重肝功能减退。（4）治疗期间须进行检验：用药前和疗程中每2~4周测定丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶，但上述试验值增高不一定预示发生临床肝炎，并可能在继续治疗过程中恢复；眼部检查，如治疗过程中出现视力减退或其他视神经炎症状时应立即进行眼部检查，并定期复查。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)