

非抗生素类抗感染药：磺胺类-氟罗沙星 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/222/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9D\\_9E\\_E6\\_8A\\_97\\_E7\\_94\\_9F\\_E7\\_c23\\_222355.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_222355.htm) 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】

氟罗沙星属于磺胺类及其增效剂栏目，主要讲述了药物名称 氟罗沙星 药物别名 多氟哌酸

Quinodis、FLX、AM833 英文名称 Fleroxacin 说明片剂：0。

功用作用 本品为氟吡酮酸类广谱抗生素，对革兰阳性菌及阴性菌均有较强的抗菌作用。对敏感革兰阳性菌及阴性菌所致呼吸道及泌尿道等的感染。不易与茶碱等嘌呤类生物碱发生作用。

。本文重点关注药物作用 兰阳 阴性 等内容，您可以在本页对氟罗沙星进行讨论【关键字】磺胺类及其增效剂.药物.作用.兰阳.阴性.氟罗沙星【全文】

药物名称 氟罗沙星 药物别名 多氟哌酸 Quinodis、FLX、AM833英文名称 Fleroxacin 说明片剂：0.2g、0.4g。

功用作用 本品为氟吡酮酸类广谱抗生素，对革兰阳性菌及阴性菌均有较强的抗菌作用。对敏感革兰阳性菌及阴性菌所致呼吸道及泌尿道等的感染。用法用量

口服，成人，0.2g~0.4g/日，1次/日。注意事项 胃肠道反应，如恶心、腹泻及食欲减退等。不易与茶碱等嘌呤类生物碱发生作用。

（1）服药初期可有上腹部不适感，一般不需停药，可逐渐自行消退，但有胃溃疡史的病人，应慎用。

（2）少数病人可引起氨基转移酶升高，停药后可恢复正常。

（3）少数病人可出现周围神经刺激症状，四肢皮肤有针扎感，或有轻微的灼热感，加用维生素B1和B12可减轻。滴注给药可引起局部刺激、脉管炎等。

（4）一般不用于幼儿。（5）

孕妇、严重肾功能不全患者慎用。转贴于：100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)