

非抗生素类抗感染药：磺胺类-氟胞嘧啶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_222365.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】

氟胞嘧啶属于磺胺类及其增效剂栏目，主要讲述了药物名称 氟胞嘧啶 药物别名 英文名称

Flucytosin 说明片剂：每片250mg。功用作用 抗真菌药，对念珠菌、隐球菌，以及地丝菌有良好的抑制作用，对部分曲菌，以及引起皮肤真菌病的分支孢子菌、瓶真菌等也有作用。

对其他真菌和细菌都无作用。临床上本品用于念珠菌和隐球菌感染，单用效...。本文重点关注胞嘧啶作用 真菌 以及 等内容，您可以在本页对氟胞嘧啶进行讨论【关键字】

磺胺类及其增效剂.胞嘧啶.作用.真菌.以及.氟胞嘧啶【全文】药物名称 氟胞嘧啶药物别名 英文名称

Flucytosin说明片剂：每片250mg；500mg。注射液：2.5g（250ml）。功用作用 抗真菌药，对念珠菌、隐球菌，以及地丝菌有良好的抑制作用，对部分曲菌，以及引起皮肤真菌病的分支孢子菌、瓶真菌等也有作用。

对其他真菌和细菌都无作用。口服吸收良好，3~4小时血药达到高峰，血中半衰期为8~12小时，可透过血脑屏障。临床上本品用于念珠菌和隐球菌感染，单用效果不如两性霉素B，可与两性霉素B合用以增疗效（协同作用）。

用法用量 口服：1日4~6g，分4次服，疗程自数周至数月。静注，1日量50~150mg/kg，分2~3次单用本品时真菌易产生耐药性，宜与两性霉素B合用。注意事项 不良反应有：氨基转移酶、碱性磷酸酶值升高、胃肠道症状、白细胞减少，贫血、血小板减少、肾损害、头痛、视力减退、幻觉、听力下

降。

用法用量 口服：1日4~6g，分4次服，疗程自数周至数月。静注，1日量50~150mg/kg，分2~3次单用本品时真菌易产生耐药性，宜与两性霉素B合用。注意事项 不良反应有：氨基转移酶、碱性磷酸酶值升高、胃肠道症状、白细胞减少，贫血、血小板减少、肾损害、头痛、视力减退、幻觉、听力下

降。

用法用量 口服：1日4~6g，分4次服，疗程自数周至数月。静注，1日量50~150mg/kg，分2~3次单用本品时真菌易产生耐药性，宜与两性霉素B合用。注意事项 不良反应有：氨基转移酶、碱性磷酸酶值升高、胃肠道症状、白细胞减少，贫血、血小板减少、肾损害、头痛、视力减退、幻觉、听力下

降、运动障碍、血清钾、钙磷值下降，以及过敏反应（如皮疹）等。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com