

非抗生素类抗感染药：抗结核、麻风分支杆菌类药3 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_226779.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】利福霉素钠属于抗结核、麻风分支杆菌类栏目，主要讲述了药物名称 利福霉素钠 药物别名 利福霉素SV 英文名称 Rifamycin Sodium 说明 注射用利福霉素钠：每瓶250mg。125g（2ml），供肌注用。功用作用 对金黄色葡萄球菌（包括耐青霉素和耐新青霉素株）、结核杆菌有较强的抗菌作用。对常见革兰阴性菌的作用弱。。本文重点关注 霉素 肌注 作用 引起 等内容，您可以在本页对利福霉素钠进行讨论【关键字】抗结核、麻风分支杆菌类.霉素.肌注.作用.引起.利福霉素钠【全文】药物名称 利福霉素钠 药物别名 利福霉素SV 英文名称 Rifamycin Sodium 说明 注射用利福霉素钠：每瓶250mg。注射液：每支0.25g（5ml），供静滴用；0.125g（2ml），供肌注用。功用作用 对金黄色葡萄球菌（包括耐青霉素和耐新青霉素株）、结核杆菌有较强的抗菌作用。对常见革兰阴性菌的作用弱。口服吸收差。注射后体内分布以肝脏和胆汁内为最高，在肾、肺、心、脾中也可达治疗浓度。与他类抗生素或抗结核药之间未发现交叉耐药性。用于不能口服用药的结核患者和耐药金葡菌引起的胆道、呼吸道、泌尿道等部位感染。用法用量（1）肌注：成人1次250mg，每8～12小时1次。（2）静注（缓慢推注）：1次500mg，1日2～3次。小儿1日量10～30mg/kg。此外亦可稀释至一定浓度局部应用或雾化吸入。重症患者宜先静脉滴注，待病情好转后改肌注。用于治疗肾盂肾炎时，每日剂量

在750mg以上。对于严重感染，开始剂量可酌增到1000mg / d。 注意事项（1）本品的副作用参见利福平。（2）肌注可引起局部疼痛，有时可引起硬结、肿块。（3）静注后可出现巩膜或皮肤黄染。（4）本品偶引起耳鸣、听力下降。 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com