

非抗生素类抗感染药：抗结核、麻风分支杆菌类药2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_226780.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】利福喷丁属于抗结核、麻风分支杆菌类栏目，主要讲述了功用作用 抗菌谱性质与利福平相同，对结核杆菌、麻风杆菌、金黄色葡萄球菌、某些病毒、衣原本品的外文名为Rifandin。国外，类似名称Rifadin系利福平的一种商品名（美国Merrell Dow药厂），注意区别。体等微生物有抗菌作用，其抗结核杆菌的作用比利福平强2~10倍。8 μg / ml。。本文重点关注ml作用 利福平 小时 等内容，您可以在本页对利福喷丁进行讨论【关键字】抗结核、麻风分支杆菌类.ml.作用.利福平.小时.利福喷丁【全文】药物名称 利福喷丁药物别名 环戊哌利福霉素英文名称 Rifapentine说明片（胶囊）剂：每片（胶囊）150mg、300mg。功用作用 抗菌谱性质与利福平相同，对结核杆菌、麻风杆菌、金黄色葡萄球菌、某些病毒、衣原本品的外文名为Rifandin。国外，类似名称Rifadin系利福平的一种商品名（美国Merrell Dow药厂），注意区别。体等微生物有抗菌作用，其抗结核杆菌的作用比利福平强2~10倍。空腹一次服本品（细晶）400mg，血药峰浓度约为16.8 μg / ml；在4~12小时间可保持15.35~16.89 μg / ml；48小时尚有5.4 μg / ml。尿药浓度，在12~24小时间为16.52~37.98 μg / ml。体内分布，以肺、肝、肾脏中较多，在骨组织和脑组织中也有相当浓度。本品主要以原形及代谢物形式自粪便排泄。t_{1/2}平均为18小时。主要用于治疗结核病（常与其他抗结核药联合应用）。用法用量 1次600mg，每

周只用1次（其作用约相当于利福平600mg，每日1次）。必要时可按上量，每周2次。注意事项（1）与利福平有完全的交叉耐药性。（2）必须空腹给药，饱食后服药或并用制酸药，则其生物利用度明显降低。（3）本品粗晶的生物利用度低（仅为细晶的 $1/4 \sim 1/3$ ）。（4）肝功能不良及孕妇禁用。（5）本品可引起皮疹，白细胞数下降，氨基转移酶值升高，并与其他利福霉素有交叉过敏反应。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com